Vinorelbine mono (Navelbine)

Beste patiënt(e)

In deze brochure geven we graag meer informatie over de behandeling die je arts heeft voorgesteld: vinorelbine mono.

We wensen je veel succes en moed toe en staan voor je klaar tijdens je behandeling.

De diensten oncologie en hematologie

Wat is Vinorelbine?

Vinorelbine is een geneesmiddel voor chemotherapie dat de celdeling remt om zo kankercellen te bestrijden.

Hoe wordt het toegediend?

- De therapie gebeurt in het oncologisch dagziekenhuis.
- Je krijgt de behandeling via een infuus in een ader in je arm of via een poortcatheter/PICC. Dit gebeurt met een chemopomp zodat de juiste dosis over de juiste tijdspanne kan toegediend worden.
- Het inlopen van de Vinorelbine duurt 30 minuten.
- Voor en na de behandeling met Vinorelbine krijg je extra vocht. Voor de behandeling krijg je ook medicatie tegen misselijkheid (Litican).
- De kuur loopt over 3 weken: in week 1 en 2 krijg je een chemobehandeling, daarna volgt een week rust.
- De duur van de behandeling hangt af van hoe de kanker reageert en hoe goed je de behandeling verdraagt.

azdelta

Deze brochure is laatst aangepast op 19/10/2026 0520 5381-NL

Wat zijn de mogelijke nevenwerkingen?

- Invloed op de bloedcellen (rode, witte en bloedplaatjes)
- Vermoeidheid
- Misselijkheid en braken
- Ernstige vorm van haarverdunning die meestal begint na een 3-tal weken
- Koorts van meer dan 38.5 graden (teken van infectie)
- Verminderde eetlust en smaakverandering
- Pijnlijke mond (aften of ontsteking mondslijmvlies)
- Verstopping/diarree
- Tintelingen in handen/voeten (zenuwpijnen)
- Verminderde nierfunctie. Daarom is het belangrijk om dagelijks 1,5 liter water te drinken.

Nabehandeling thuis en praktische info

- Je krijgt **medicatie** mee naar huis tegen misselijkheid (Litican) samen met een innameschema.
- In principe mag je **alles eten en drinken**. Ook een glaasje alcohol is toegestaan maar met mate.
- Vermijd blootstelling aan de **zon**, gebruik zonneproducten met een hoge beschermingsfactor (50+) en draag een hoofddeksel.
- Resten van de chemotherapie kunnen nog enkele dagen aanwezig zijn in je lichaam. Gebruik daarom tot 7 dagen na je therapie een **voorbehoedsmiddel** bij seksueel contact.
- Doe het **toilet**deksel dicht na elke toiletbeurt en spoel 2 keer door. Mannelijke patiënten raden we aan zittend te plassen.
- Volg je **stoelgang** goed op, sommige medicatie kan zorgen voor obstipatie.
- Controleer regelmatig je **lichaamstemperatuur**. Neem bij een verhoging boven de 38 graden altijd contact op met je huisarts of specialist.

- De **verpleegkundig consulent** begeleidt je tijdens je behandeling.
- De **sociaal assistent** komt langs bij de opstart van de therapie om info te geven over mogelijke tegemoetkomingen, reiskosten, sociale voorzieningen, enz...
- De **diëtiste** geeft tips en voedingsadviezen bij je therapie

- Bij je vertrek uit het ziekenhuis leggen we een volgende afspraak vast en krijg je een overzicht van de medicatie die je nog moet nemen.
- Afhankelijk van je bloedresultaten en algemene toestand bestaat de kans dat je behandeling voor enkele dagen wordt uitgesteld of dat er een aanpassing van de dosis nodig is.
- Meestal plannen we na 2 volledige cyclussen een CT van de borst.
- Vóór elke therapie nemen we bloed af in het ziekenhuis of via de huisarts op dag 8 en dag 15.

- In je infomapje vind je:
  - een nauwkeurige beschrijving en nuttige tips over bijwerkingen.
  - een telefoonlijst om ons te contacteren bij vragen, problemen of als je ongerust bent