Vitrakvi 25/100 mg (= Larotrectinib)

Beste patiënt

Uw arts heeft u deze behandeling voorgesteld, we geven u hier graag meer uitleg.
We wensen u veel succes en moed toe met uw behandeling.

De diensten oncologie en hematologie

Wat is Vitrakvi?

- Geneesmiddel voor patiënten met een niet-kleincellige longkanker, met NTRK-positief gen
- Bevat de stof Larotrectinib.
- Voor patiënten waarbij de ziekte het gevolg is van een fout in het gen NTRK. Door deze fout wordt een abnormaal eiwit gevormd dat de groei van kankercellen bevordert.

Hoe werkt Vitrakvi?

Vitrakvi blokkeert de werking van het eiwit en vertraagt zo de groei en verspreiding van kankercellen.

Hoe wordt Vitrakvi toegediend?

- Harde capsule met een dosis van 100 mg (wit-blauwe kleur)
- Aanbevolen dosis is 200 mg (= 2 capsules)
- 2 maal per dag en liefst op hetzelfde tijdstip
- Mag ingenomen worden met voedsel
- De capsules in zijn geheel innemen met water, niet op bijten of fijnmaken.
- Bij braken na doorslikken van de capsules, geen nieuwe nemen, maar wachten tot volgende geplande dosis.

Wisselwerking met andere geneesmiddelen?

- Meld uw arts bij start van elk nieuw medicijn als u andere geneesmiddelen neemt. Zo kan de arts nagaan of er een

azdelta
Uw ziekenhuis.

Deze brochure is laatst aangepast op 09/08/2023 0520 6191-NL

wisselwerking zou kunnen optreden.

Mogelijke bijwerkingen

- Vermoeidheid
- Verminderde eetlust
- Misselijkheid / Braken
- Spierpijn en zwakte
- Gevoeligheid voor zonlicht , gebruik steeds zonnecrème met beschermingsfactor 50+
- Afwijkende bloeduitslagen lever- en nierfunctie
- Obstipatie / diarree
- Invloed op bloedcellen (anemie)
- Gewichtstoename

Nabehandeling thuis en praktische info

- **Inname van pompelmoes en pompelmoessap is verboden, anders kan dosis Vitrakvi zo hoog worden dat ze schadelijk is voor gezondheid.**
- Bewaar medicatie op veilige plaats, buiten het bereik van kinderen.
- Orale anticonceptie zal zijn werkzaamheid verliezen bij inname van Vitrakvi dus gebruik er een ander voorbehoedsmiddel bij.
- Neem het geneesmiddel precies in zoals uw arts dat heeft uitgelegd.
- Medicatie is enkel beschikbaar in ziekenhuisapotheek.
- Ook hoelang is afhankelijk van de effecten van de behandeling.
- Belangrijk is medicatie niet aan te raken met uw handen, duw ze uit in een potje en neem ze dan in.
- Door problemen met duizeligheid kunt u best geen voertuigen of machines besturen.
- In geval van koorts van meer dan 38° C steeds contact op te nemen met zorgverlener.
- Mannen raden we aan steeds zittend te plassen.
- 2 weken na de opstart is er een raadpleging gepland bij uw arts.
- Na 6 weken wordt er een CT thorax/abdomen voorzien
- Als er andere bijwerkingen of problemen zijn, noteer ze en stel ze gerust aan uw arts bij de volgende afspraak.
- Bij ongerustheid of onzekerheid aarzel niet om ons vroegtijdig te contacteren (telefoonlijst zie infomapje)