Doelgerichte therapie: Bravtovi (encorafenib) en Mektovi (binimetinib)

Beste patiënt

Je arts heeft je een behandeling met Bravtovi Mektovi voorgesteld. In deze infobrochure geven we je graag meer informatie.

Veel succes en goede moed met je behandeling!

De dienst oncologie

Hoe werkt Braftovi Mektovi?

Doelgerichte therapie met BRAF/MEK-remmers kan een behandeling zijn bij een melanoom. De therapie werkt alleen als je een BRAFV600-mutatie hebt: een foutje in het BRAF-gen waardoor de tumor blijft groeien.

Een gen is een stukje DNA dat een bepaalde functie heeft. Door een foutje (mutatie) in het BRAF-gen kunnen cellen zich ongecontroleerd delen waardoor een melanoom ontstaat. Ongeveer de helft van de patiënten met een melanoom heeft een foutje in het BRAF-gen.

In dit geval is doelgerichte therapie aangewezen, een behandeling met medicijnen die heel gericht werken tegen sommige soorten kankercellen. Zo kan deze therapie kankercellen doden of de celdeling ervan afremmen. De medicijnen verspreiden zich via het bloed door je lichaam. Ze kunnen op bijna alle plaatsen kankercellen bereiken.

De behandeling bestaat uit tabletten die je thuis zelf inneemt.

azdelta

Deze brochure is laatst aangepast op 14/09/2026 0520 6331-NL

Hoe de medicatie in te nemen?

Encorafenib (Braftovi®) is beschikbaar in capsules van 50 en 75 mg.
Binimetinib (Mektovi®) is beschikbaar in tabletten van 15 mg en 45mg.

Encorafenib (Braftovi®)	75mg	1 keer per dag	6 capsules
Binimetinib (Mektovi®)	45mg	2 keer per dag	-1 tablet 's morgens -1 tablet 's avonds

- Neem je medicatie altijd op hetzelfde tijdstip in
- Laat minstens 12u. tussen je ochtend- en avonddosis van Binimetinib.
- Je kan de capsules en tabletten met of zonder voedsel innemen. Inname met voedsel zorgt voor minder kans op maagklachten.
- Je mag niet op de medicatie kauwen of de capsules openen.

Je arts kan beslissen om
- de behandeling met een lagere dosis op te starten
- de dosering van de behandeling (tijdelijk of definitief) te verminderen
- de therapie even te onderbreken.

Dat gebeurt als je het geneesmiddel minder goed verdraagt. Zo krijgt je lichaam de kans om te herstellen. Een aanpassing van de dosis komt vaak voor.

Je arts bepaalt de duur van de behandeling op basis van hoe je de behandeling verdraagt en het effect ervan.

Bijwerkingen

Bijwerkingen ondervind je soms pas later tijdens de behandeling en verschillen van persoon tot persoon. Ze verminderen vaak als je de medicatie langere tijd inneemt.
Mogelijke bijwerkingen:

- **misselijkheid en verminderde eetlust**De misselijkheid treedt meestal op tijdens een korte periode, vooral in de beginfase van de behandeling. Vermijd zware vetrijke voeding en vraag advies aan een verpleegkundige of arts voor ondersteunende medicatie.
- **spier- en gewrichtspijn**
  Neem een pijnstiller (bv. paracetamol 1 gram, max. 4 keer per dag)
- **verhoogde bloeddruk / hartproblemen**
- **leverfunctiestoornissen**
- **vermoeidheid**
- **diarree**
  Gebruik loperamide (Imodium®) en verwittig je verpleegkundige of arts.
- **hoofdpijn**
  Neem een pijnstiller (bv. paracetamol 1 gram, max. 4 keer per dag)
- **veranderingen aan de huid (bijv. droge huid)**
- **oogproblemen**
  Oogproblemen kunnen het gezichtsvermogen aantasten als ze niet worden behandeld. Neem daarom onmiddellijk contact op met je verpleegkundige, arts of het ziekenhuis.
- **koorts**
  Neem contact op met je verpleegkundige, arts of het ziekenhuis als je temperatuur gelijk of hoger dan 38 graden.

Breng je verpleegkundige of arts altijd op de hoogte als je last hebt van bijwerkingen. Ze geven je graag advies om de klachten te verminderen of te behandelen.

Aandachtspunten

- Door de behandeling met Encorafenib en Binimetinib is de huid veel gevoeliger voor zonlicht, waardoor je sneller verbrandt. Gebruik een **zonnecrème met beschermingsfactor 50**. Smeer je 30 minuten voor je in de zon gaat in en herhaal dit elke twee uur.
- Drink **geen pompelmoessap** tijdens de behandeling. Pompelmoes kan de concentratie van het geneesmiddel in je bloed verhogen, waardoor er meer bijwerkingen mogelijk zijn.
- Gebruik **geen preparaten op basis van sint-janskruid** omdat dit een negatieve invloed heeft op de werking van de medicatie.
- Bij koorts, hoofd-, spier- en gewrichtspijn mag je 1 gram **paracetamol** tot maximaal 4 keer per dag innemen. Controleer daarom regelmatig je lichaamstemperatuur.
- Heb je last van **wazig zicht, droge of rode ogen of een ontsteking van je ogen?** Neem contact op met je arts.