Immunotherapie avelumab (Bavencio®)

Beste patiënt

Uw arts heeft u volgende behandeling voorgesteld. We geven u hier graag meer informatie.
We wensen u veel succes en goede moed met uw behandeling.

De dienst oncologie

Vrij nieuwe behandeling

Immunotherapie is een vrij nieuwe kankerbehandeling. De traditionele behandelingen, zoals radiotherapie (bestralingen) en chemotherapie, richten zich rechtstreeks op de kankercellen. Ze verhinderen dat kankercellen zich verder kunnen delen waardoor de kwaadaardige cellen afsterven. Helaas grijpt chemotherapie ook in op de gezonde cellen in het lichaam wat aanleiding geeft tot bijwerkingen.

Immunotherapie daarentegen activeert en versterkt het eigen immuunsysteem zodat dit de kankercellen kan herkennen en vernietigen.
Bij deze behandeling komen ook bijwerkingen voor, maar ze zijn verschillend van de bijwerkingen ten gevolge van chemotherapie of radiotherapie.

Toediening

Avelumab wordt om de 2 weken toegediend in het dagziekenhuis met een infuus (baxter). Eens de behandeling werd opgestart, krijgt u deze behandeling zolang de ziekte onder controle blijft en u geen last hebt van ernstige bijwerkingen. Avelumab loopt in in een tijdspanne van ongeveer 60 minuten. Reken erop dat u voor het volledige verloop een voor- of namiddag kan doorbrengen in het ziekenhuis.

azdelta
Uw ziekenhuis.

Deze brochure is laatst aangepast op 04/01/2023 0520 6187-NL

Er kan zich een infuusreactie voordoen. Om dat te voorkomen krijgt u de eerste 4 cycli ondersteunende medicatie, namelijk Levocetirizine en paracetamol. Nadien beslist uw arts of het nodig is om de ondersteunende medicatie verder te nemen.
Een infuusreactie kenmerkt zich door huiduitslag, al dan niet in combinatie met jeuk (eventueel over het hele lichaam), een gevoel van benauwdheid, lage bloeddruk, koorts of rillingen. Soms gaat een reactie gepaard met een gevoel van misselijkheid of met overmatig transpireren. Het is belangrijk dat u dergelijke gewaarwordingen onmiddellijk meldt aan de verpleegkundige of arts, zodat er vlug en gepast kan worden gereageerd.

Nevenwerkingen

Soms activeert de behandeling het afweersysteem zodanig dat het niet alleen de kankercellen, maar ook eigen, gezonde cellen aanvalt. Dit kan zich ook uiten onder de vorm van klachten die onschuldig lijken zoals jeuk, buikpijn en diarree. Het is dan ook erg belangrijk uw klachten tijdig te melden. Symptomen kunnen op ieder moment optreden tijdens de behandeling en soms zelfs maanden na het stoppen van de behandeling. Regelmatig gebeurt ook een bloedafname, onder andere om deze bijwerking op te sporen. Soms kan het door deze nevenwerking noodzakelijk zijn de behandeling te stoppen.

De belangrijkste symptomen van immuungerelateerde bijwerkingen:

- Problemen met uw longen. Zoals ademhalingsproblemen of hoesten. Dit kunnen verschijnselen zijn van ontsteking van de longen.
- Diarree (waterige, dunne of zachte ontlasting) of symptomen van ontsteking van de darmen zoals buikpijn en slijm of bloed in de ontlasting.
- Ontsteking van de lever. Klachten of symptomen zijn bijvoorbeeld afwijkingen in leverfunctietesten (bloedafname), geel worden van de ogen of huid.
- Ontsteking of problemen met uw nieren. Klachten zijn bijvoorbeeld afwijkingen in nierfunctietesten (bloedafname) of minder urine produceren.

- Problemen met uw hormoonproducerende klieren (waaronder de hypofyse, schildklier en de bijnieren). Klachten zijn bijvoorbeeld vermoeidheid, gewichtsverandering of hoofdpijn en verstoord gezichtsvermogen.
- Diabetes (suikerziekte). Symptomen hiervan zijn buitensporige dorst, toename van eetlust met vermindering van gewicht, vermoeidheid, sufheid.
- Ontsteking van de huid die uitslag en jeuk kan veroorzaken.

Nabehandeling thuis en praktische info

Als uw waarden van het lab niet goed zijn of als uw nevenwerkingen te zwaar zijn kan uw arts beslissen de behandeling uit te stellen of definitief te stoppen.
Bij vragen of ongemakken kunt u contact opnemen met het ziekenhuis, zie telefoonlijst in deze infomap