Immunotherapie Libtayo 350 mg (Cemiplimab)

Beste patiënt(e)

Uw arts heeft u deze behandeling voorgesteld, we geven u hier graag meer uitleg.
We wensen u veel succes en moed toe met uw behandeling.

De diensten oncologie en hematologie

Wat is Libtayo?

- Is een therapie die uw immuunsysteem versterkt en activeert zodat het afweersysteem de kanker aanvalt.

Hoe werkt Libtayo?

- Is een monoklonaal antilichaam. (soort eiwit dat als doel heeft een antigen in bepaalde lichaamscellen te herkennen en zich daaraan te binden.)
- Het schakelt de werking uit van bepaalde cellen, waardoor het immuunsysteem wordt verbeterd en kankercellen vernietigd.

Hoe wordt Libtayo toegediend?

- Dosis is 350 mg
- Het product wordt toegediend via een infuus in een ader of PAC, en loopt gedurende een half uur.
- Om de 3 weken krijgt u een behandeling in het dagziekenhuis.
- Voor en na de toediening zal er een spoelinfuus aangehangen worden.

Wat zijn de mogelijke nevenwerkingen?

- Immunotherapie stimuleert het immuunsysteem. Soms zorgt dit ervoor dat het afweersysteem het eigen lichaam gaat aanvallen en dus bepaalde organen kunnen ontstoken geraken.

azdelta
Uw ziekenhuis.

Deze brochure is laatst aangepast op 23/12/2022 0520 6320-NL

- Ontsteking van de darmen met buikpijn of diarree als gevolg (waterige, dunne of zachte ontlasting)
- Vermoeidheid en algemeen zwak voelen
- Ontsteking van de huid met huiduitslag en jeuk als gevolg
- Verminderde eetlust
- Ontsteking van de longen met hoest en ademhalingsproblemen als gevolg
- Ontsteking van de zenuwen, met tintelingen als gevolg
- Verhoogde bloedsuikerspiegels
- Problemen met hormoonproducerende klieren(schildklier, bijnieren...)

Nabehandeling thuis en praktische info

- Als u één van de verschijnselen hebt zoals hierboven beschreven, moet u onmiddellijk uw arts of verpleegkundig consulent contacteren (zie telefoonlijst in uw infomapje)
- Als uw bijwerkingen te zwaar zijn kan uw arts beslissen de behandeling uit te stellen of definitief te stoppen.
- Voor elke toediening gebeurt er een bloedafname.
- Na 2 toedieningen is er een CT thorax gepland en een onderzoek longfunctie. Na verloop van tijd zal de CT om de 9 weken gebeuren.
- **Goede opvolging van uw temperatuur is héél belangrijk!!**
- Bij een verhoging boven de 38 graden neemt u steeds contact op met uw huisarts.
- Bij vragen, problemen of ongerustheid aarzel niet om contact met ons op te nemen (zie telefoonlijst in uw infomapje)