

# Immunotherapie Libtayo 350 mg (Cemiplimab)

Beste patiënt(e)

Uw arts heeft u deze behandeling voorgesteld, we geven u hier graag meer uitleg.

We wensen u veel succes en moed toe met uw behandeling.

De diensten oncologie en hematologie

## Wat is Libtayo?

- Is een therapie die uw immuunsysteem versterkt en activeert zodat het afweersysteem de kanker aanvalt.

## Hoe werkt Libtayo?

- Is een monoklonaal antilichaam. (soort eiwit dat als doel heeft een antigen in bepaalde lichaamcellen te herkennen en zich daaraan te binden.)
- Het schakelt de werking uit van bepaalde cellen, waardoor het immuunsysteem wordt verbeterd en kankercellen vernietigd.

## Hoe wordt Libtayo toegediend?

- Dosis is 350 mg
- Het product wordt toegediend via een infuus in een ader of PAC, en loopt gedurende een half uur.
- Om de 3 weken krijgt u een behandeling in het dagziekenhuis.
- Voor en na de toediening zal er een spoelinfuus aangehangen worden.

## Wat zijn de mogelijke nevenwerkingen?

- Immunotherapie stimuleert het immuunsysteem. Soms zorgt dit ervoor dat het afweersysteem het eigen lichaam gaat aanvallen en dus bepaalde organen kunnen ontstoken geraken.



- Ontsteking van de darmen met buikpijn of diarree als gevolg (waterige, dunne of zachte ontlasting)
- Vermoeidheid en algemeen zwak voelen
- Ontsteking van de huid met huiduitslag en jeuk als gevolg
- Verminderde eetlust
- Ontsteking van de longen met hoest en ademhalingsproblemen als gevolg
- Ontsteking van de zenuwen, met tintelingen als gevolg
- Verhoogde bloedsuikerspiegels
- Problemen met hormoonproducerende klieren(schildklier, bijniere...)

## Nabehandeling thuis en praktische info

- Als u één van de verschijnselen hebt zoals hierboven beschreven, moet u onmiddellijk uw arts of verpleegkundig consulent contacteren ( zie telefoonlijst in uw infomapje)
- Als uw bijwerkingen te zwaar zijn kan uw arts beslissen de behandeling uit te stellen of definitief te stoppen.
- Voor elke toediening gebeurt er een bloedafname.
- Na 2 toedieningen is er een CT thorax gepland en een onderzoek longfunctie. Na verloop van tijd zal de CT om de 9 weken gebeuren.
- **Goede opvolging van uw temperatuur is héél belangrijk!!**
- Bij een verhoging boven de 38 graden neemt u steeds contact op met uw huisarts.
- Bij vragen, problemen of ongerustheid aarzel niet om contact met ons op te nemen (zie telefoonlijst in uw infomapje)