Keytruda (Pembrolizumab)

Beste patiënt(e)

Uw arts heeft u deze behandeling voorgesteld, we geven u hier graag meer uitleg.
We wensen u veel succes en moed toe met uw behandeling.

De diensten oncologie en hematologie

Wat is Keytruda?

- Keytruda is een therapie die uw immuunsysteem versterkt en activeert zodat het afweersysteem de kanker aanvalt.

Hoe werkt Keytruda?

- Het is een soort eiwit dat als doel heeft een antigen in bepaalde lichaamscellen te herkennen en zich daar aan te binden.
- Het schakelt de werking uit van bepaalde cellen, waardoor het immuunsysteem wordt verbeterd en kankercellen kan vernietigen.

Hoe wordt Keytruda toegediend?

- De dosis is 200 mg.
- Het product wordt toegediend via een infuus in een ader of PAC, en loopt in gedurende een half uur.
- Om de 3 weken krijgt u een behandeling in het dagziekenhuis.
- Voor en na de toediening zal er een spoelinfuus aangehangen worden.
- Na verloop van tijd kan frequentie wijzigen naar om de 6 weken met dosis van 400 mg

Wat zijn de mogelijke nevenwerkingen?

- Immunotherapie stimuleert het immuunsysteem. Soms zorgt dit ervoor dat het afweersysteem het eigen lichaam gaat aanvallen en dus bepaalde organen kunnen ontstoken geraken.
- Ontsteking van de darmen met buikpijn of diarree als

azdelta
Uw ziekenhuis.

Deze brochure is laatst aangepast op 02/10/2025 0520 5366-NL

gevolg (waterige, dunne of zachte ontlasting)
- Vermoeidheid en algemeen zwak voelen
- Ontsteking van de huid met huiduitslag en jeuk als gevolg
- Verminderde eetlust
- Ontsteking van de longen met hoest en ademhalingsproblemen als gevolg
- Ontsteking van de zenuwen, met tintelingen als gevolg
- Verhoogde bloedsuikerspiegels
- Problemen met hormoonproducerende klieren (schildklier, bijnieren...)

Nabehandeling thuis en praktische info

- Als u één van de verschijnselen hebt zoals hierboven beschreven, moet u **onmiddellijk uw arts of verpleegkundig consulent contacteren** (zie telefoonlijst in uw infomapje)
- Als uw bijwerkingen te zwaar zijn, kan uw arts beslissen de behandeling uit te stellen of definitief te stoppen.
- Voor elke toediening gebeurt er een bloedafname.
- Na 2 toedieningen is er een CT thorax gepland en een onderzoek van de longfunctie. Na verloop van tijd zal de CT om de 9 weken gebeuren.
- **Goede opvolging van uw temperatuur is héél belangrijk!!**
- Bij een verhoging boven de 38 graden neemt u steeds contact op met uw huisarts.
- Bij vragen, problemen of ongerustheid aarzel niet om contact met ons op te nemen (zie telefoonlijst in uw infomapje)