

Opdivo (Nivolumab) + Ipilimumab

Beste patiënt(e)

Uw arts heeft u deze behandeling voorgesteld, we geven u hier graag meer uitleg.

We wensen u veel succes en moed toe met uw behandeling.

De diensten oncologie en hematologie

Wat is Opdivo en Ipilimumab

- Is een therapie die uw immuunsysteem versterkt en activeert zodat het afweersysteem de kanker aanvalt.
- Het stimuleert het immuunsysteem zodat dit op een krachtige wijze de kankercellen kan herkennen en vernietigen.

Hoe werkt Opdivo en Ipilimumab ?

- Is een monoklonaal antilichaam. (= soort eiwit dat als doel heeft een antigeen in bepaalde lichaamcellen te herkennen en zich daar aan te binden.)
- Het schakelt de werking uit van de bepaalde cellen, waardoor het immuunsysteem wordt verbeterd en het kankercellen kan vernietigen.

Hoe worden Opdivo en Ipilimumab toegediend ?

- De dosis bedraagt 3mg/kg voor Opdivo en 1mg/kg voor Ipilimumab
- Het product wordt toegediend via een infuus in een ader of PAC, en loopt gedurende half uur.
- Om de 3 weken krijgt u een behandeling via dagziekenhuis.
- Opdivo wordt om de 3 weken gegeven en Ipilimumab om de 6 weken.
- Voor en na de toediening van Opdivo en Ipilimumab wordt er nog een spoelinfuus aangehangen.

Wat zijn de mogelijke nevenwerkingen ?

- Immunotherapie stimuleert het immuunsysteem, soms zorgt dat ervoor dat afweersysteem het eigen lichaam gaat aanvallen en dus bepaalde organen kunnen ontstoken geraken.
- Ontsteking van de darmen ==> met buikpijn of diarree als gevolg (waterige, dunne of zachte ontlasting)
- Vermoeidheid en algemeen zwak voelen
- Ontsteking van de huid==>huiduitslag en jeuk als gevolg
- Verminderde eetlust
- Ontsteking van de longen==> met hoest en ademhalingsproblemen als gevolg
- Ontsteking van de zenuwen, met tintelingen als gevolg
- Verhoogde bloedsuikerspiegels
- Problemen met hormoonproducerende klieren. (schildklier, bijniere...)

Nabehandeling thuis en praktische info

- Als u één van de verschijnselen zoals hierboven uitgelegd, hebt, moet u onmiddellijk uw arts of verpleegkundig consulent contacteren (zie telefoonlijst in uw infomapje)
- Als uw bijwerkingen te zwaar zijn kan uw arts beslissen de behandeling uit te stellen of definitief te stoppen.
- Voor elke toediening zal er een bloedafname en een RX thorax gebeuren.
- Na 2 toedieningen zal er een CT thorax plaatsvinden.
- Na verloop van tijd gebeurt de CT-controle om de 9 weken.
- **Goede opvolging van uw temperatuur is héél belangrijk!!**
- Bij een verhoging boven de 38 graden steeds uw huisarts contacteren !!
- Bij vragen, problemen of ongerustheid aarzel niet om contact met ons op te nemen (zie telefoonlijst in uw infomapje)