

Immunotherapie atezolizumab (Tecentriq®)

Beste patiënt

Uw arts heeft u volgende behandeling voorgesteld. We geven u hier graag meer informatie.

We wensen u veel succes en goede moed met uw behandeling.

De dienst oncologie

Wat is atezolizumab (merknaam: Tecentriq®)?

Dit is een vrij nieuwe kankerbehandeling. De traditionele behandelingen, zoals radiotherapie (bestralingen) en chemotherapie, richten zich rechtsreeks op de kankercellen. Ze verhinderen dat kankercellen zich verder kunnen delen waardoor de kwaadaardige cellen afsterven. Helaas grijpt chemotherapie ook in op de gezonde cellen in het lichaam wat aanleiding geeft tot nevenwerkingen. Immunotherapie daarentegen activeert en versterkt het eigen immuunsysteem en valt langs deze weg enkel de kankercellen aan. Bij deze behandeling komen ook nevenwerkingen voor, maar ze zijn verschillend van de nevenwerkingen ten gevolge van chemotherapie of radiotherapie.

Het wordt het toegediend?

Atezolizumab wordt steeds toegediend in het dagziekenhuis met een infuus (baxter) en dit om de 3 weken. Zodra de behandeling is opgestart, krijgt u deze behandeling gewoonlijk zolang de ziekte onder controle blijft en u geen last heeft van ernstige bijwerkingen.

De inlooptijd van atezolizumab bedraagt ongeveer 30 minuten. Reken erop dat het volledige verloop een voor- of namiddag in beslag neemt.

Nevenwerkingen

Soms activeert de behandeling het afweersysteem zodanig dat het niet alleen de kankercellen, maar ook eigen, gezonde



cellen aanvalt. Dit kan zich ook uiten onder de vorm van klachten die onschuldig lijken zoals jeuk, buikpijn en diarree. Het is dan ook erg belangrijk uw klachten tijdig te melden. Symptomen kunnen op ieder moment optreden tijdens de behandeling en soms zelfs maanden na het stoppen van de behandeling. Regelmatig gebeurt ook een bloedafname, onder andere om deze bijwerking op te sporen. Soms kan het door deze nevenwerking noodzakelijk zijn de behandeling te stoppen.

De belangrijkste symptomen van immuungerelateerde bijwerkingen

- Problemen met uw longen
Zoals ademhalingsproblemen of hoesten. Dit kunnen verschijnselen zijn van ontsteking van de longen.
- Diarree
Waterige, dunne of zachte ontlasting of symptomen van ontsteking van de darmen zoals buikpijn en slijm of bloed in de ontlasting.
- Ontsteking van de lever
Klachten of symptomen van hepatitis zijn bijvoorbeeld afwijkingen in leverfunctietesten (bloedafname), geel worden van de ogen of huid.
- Ontsteking of problemen met uw nieren
Klachten zijn bijvoorbeeld afwijkingen in nierfunctietesten (bloedafname) of minder urine produceren.
- Problemen met uw hormoonproducerende klieren (waaronder de hypofyse, schildklier en de bijnieren). Klachten zijn bijvoorbeeld vermoeidheid, gewichtsverandering of hoofdpijn en verstoord gezichtsvermogen.
- Diabetes (suikerziekte)
Symptomen hiervan zijn buitensporige dorst, toename van eetlust met vermindering van gewicht, vermoeidheid, sufheid.
- Ontsteking van de huid die uitslag en jeuk kan veroorzaken.

Nabehandeling thuis

Als uw bloedwaarden niet goed zijn of als de nevenwerkingen te zwaar zijn kan uw arts beslissen de behandeling uit te stellen of definitief te stoppen.

Bij vragen of ongemakken kan u contact opnemen met het ziekenhuis, zie telefoonlijst in de informatiegids.

