

Xalkori 250 mg/200mg (= Crizotinib)

Beste patiënt(e)

Uw arts heeft u deze behandeling voorgesteld, we geven u hier graag meer uitleg.

We wensen u veel succes en moed toe met uw behandeling.

De diensten oncologie en hematologie

Wat is Xalkori?

- Geneesmiddel voor patiënten met een gevorderde niet-kleincellige longkanker, met ALK- of ROS-positieve mutatie
- Bevat de stof Crizotinib.

Hoe werkt Xalkori?

- Voor patiënten waarbij de ziekte het gevolg is van een fout in het gen ALK. Door deze fout wordt een abnormaal eiwit gevormd dat de groei van kankercellen bevordert.
- Xalkori blokkeert de werking van het eiwit en vertraagt zo de groei en verspreiding van kankercellen.

Hoe wordt Xalkori ingenomen ?

- Harde capsule met een dosis van 250 mg of 200 mg (wit-roze kleur)
- Aanbevolen dosis is 500 mg (= 2 capsules van 250 mg)
- 2 maal per dag en liefst op hetzelfde tijdstip (1 pil 's ochtends en 1 pil 's avonds met 12 uur ertussen)
- Kan met of zonder voedsel ingenomen worden.
- Capsules in zijn geheel innemen met water, **niet** op bijten of pletten
- Bij braken na doorslikken dosis, geen extra dosis innemen maar wachten tot volgend tijdstip van inname.
- **Slik geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen!!**



Wisselwerking met andere geneesmiddelen?

- Het is aangeraden om bij start van elk nieuw medicijn de arts hiervan op de hoogte te stellen, zo kan er nagegaan worden of er een wisselwerking zou kunnen optreden.
- Sommige geneesmiddelen kunnen de werking van Xalkori verminderen of de kans op bijwerkingen verhogen.
- Eet geen pompelmoes, drink **géén pompelmoessap** of gebruik **geen preparaten op basis van sint-janskruid**

Mogelijke bijwerkingen.

- Vermoeidheid/ duizeligheid
- Misselijkheid / braken/ verminderde eetlust
- Huiduitslag (gevoeligheid aan zon en UV-licht)
- Verhoogd risico op infecties
- Obstipatie / diarree/ opgeblazen gevoel
- Invloed op de bloedcellen
- Problemen met het gezichtsvermogen (lichtflitsen zien, wazig of dubbel zien)
- Vochttopstapeling (dikke enkels/voeten)

Nabehandeling thuis en praktische info

- Bewaar medicatie op een veilige plaats, buiten bereik van kinderen en op kamertemperatuur.
- Na 2 weken is er een raadpleging met bloedafname gepland om na te gaan of u niet te veel last hebt van de medicatie
- Na 6 weken is er een CT gepland en een bloedafname om na te gaan of de therapie aanslaat, nadien zal CT en bloedafname om de 8 weken gebeuren of soms langer afhankelijk van de tolerantie en resultaten CT.
- U kunt enkel de medicatie verkrijgen in de ziekenhuisapotheek, dus na elke raadpleging krijgt u een voorschrift mee om de medicatie dan te kunnen afhalen in de ziekenhuisapotheek.
- Orale anticonceptie zal zijn werkzaamheid verliezen bij inname van Xalkori, dus gebruik er een ander betrouwbaar voorbehoedsmiddel bij.
- Neem het geneesmiddel precies in zoals uw arts dat heeft uitgelegd.
- Ook hoelang is afhankelijk van de effecten van de behandeling.
- Belangrijk is ook medicatie niet aan te raken met uw handen, duw ze uit

in een potje en neem ze dan in.

- Bij misselijkheid mag u hiervoor gerust medicatie voor nemen (Litican, Motilium of Primperan telkens 20 minuten voor elke maaltijd).
- Door problemen met gezichtsvermogen moet er opgelet worden met besturen van voertuigen of machines.
- Mannen raden we aan steeds zittend te plassen.
- **Bij koorts van meer dan 38° moet u de huisarts, behandelende arts of verpleegkundig consulent verwittigen.**
- Als er andere bijwerkingen of problemen zijn, noteer ze en stel ze gerust aan uw arts bij de volgende afspraak.
- Bij ongerustheid of onzekerheid aarzel niet om ons vroegtijdig te contacteren (telefoonlijst zie infomapje).