

Medicatie Padcev enfortumab vedotine

Beste patiënt

Uw arts heeft u volgende behandeling voorgesteld: Padcev. We geven u graag wat meer informatie.

We wensen u veel succes en goede moed met uw behandeling.

De dienst oncologie

Wat is Padcev?

Padcev is een geneesmiddel dat wordt gebruikt voor de behandeling van volwassenen met blaaskanker en kankers van de urinewegen (nierbekken, urineleider of urethra) die zich hebben verspreid of niet operatief kunnen worden verwijderd.

Padcev is een zogenaamde antibody-drug conjugate: een antilichaam gericht tegen een eiwit op kankercellen (nectin-4), gekoppeld aan een vorm van chemotherapie. Door deze aanpak wordt de chemotherapie specifiek bij de kankercel afgeleverd, waardoor de bijwerkingen minder zullen zijn.

Hoe verloopt de behandeling?

Deze behandeling vindt plaats in het dagziekenhuis oncologie. Padcev krijgt u toegediend door middel van intraveneuze (IV) infusie in uw ader gedurende 30 minuten. U ontvangt uw Padcev gedurende perioden die cycli worden genoemd. Elke PADCEV-cyclus duurt 28 dagen. U ontvangt PADCEV op dag 1, 8 en 15.

Dag 1: Padcev in het dagziekenhuis

Dag 8: Padcev in het dagziekenhuis

Dag 15: Padcev in het dagziekenhuis

Dag 21: rustweek

dag 28: start nieuwe cyclus/kuur

Uw arts beslist hoeveel kuren u nodig heeft.

Mogelijke bijwerkingen

- **Hoge bloedsuikerspiegel** (hyperglykemie).
U kunt tijdens de behandeling met Padcev een hoge bloedsuikerspiegel krijgen. Vertel het uw zorgverlener meteen als u symptomen van een hoge bloedsuikerspiegel heeft, waaronder frequent urineren, toegenomen dorst, wazig zien.
- **Huidreacties**
Uitslag en ernstige huidreacties kunnen optreden tijdens het gebruik van Padcev. Vertel het uw zorgverlener meteen als u huiduitslag of een huidreactie krijgt die steeds erger wordt.
- Tijdens het gebruik van Padcev kunt u **zenuwproblemen** krijgen die perifere neuropathie worden genoemd. Vertel het uw zorgverlener onmiddellijk als u gevoelloosheid of tintelingen in uw handen of voeten of spierzwakte krijgt.
- **Oogproblemen**
U kunt bepaalde oogproblemen krijgen tijdens het gebruik van Padcev. Vertel het uw zorgverlener meteen als u droge ogen of wazig zicht heeft. *Preventief gebruik van kunsttranen is aangewezen.*

Andere mogelijke bijwerkingen

- te weinig rode bloedcellen (bloedarmoede)
- misselijkheid, diarree en braken
- vermoeidheid
- verminderde eetlust
- veranderde smaak
- droge ogen
- haarverlies
- gewichtsverlies
- droge of jeukende huid
- huiduitslag
- platte of rode, verhoogde bultjes op de huid

Het is belangrijk om op tijd uw nevenwerkingen te melden aan uw arts of verpleegkundige.

Als u bepaalde bijwerkingen heeft, kan uw arts uw dosis verlagen of uw behandeling met PADCEV voor een bepaalde tijd (tijdelijk) of volledig stopzetten.

