

Medicatie pazopanib (Votrient®)

Beste patiënt

Uw arts heeft u volgende behandeling voorgesteld: Cabometyx. We geven u graag wat meer informatie. We wensen u veel succes en goede moed met uw behandeling.

De dienst oncologie

Wat is votrient?

Votrient is een geneesmiddel dat wordt gebruikt bij de behandeling van verschillende soorten tumoren.

Een tumor (= kwaadaardig gezwel) heeft bloedvaten nodig om van voedingsstoffen te worden voorzien (om te kunnen groeien). Tumoren hebben de eigenschap om zelf nieuwe bloedvaten aan te maken. Votrient zorgt er onder andere voor dat er geen nieuwe bloedvaten kunnen worden gevormd. Een tumor zonder nieuwe bloedvaten krijgt onvoldoende voedingsstoffen; op deze manier kunnen de kwaadaardige cellen afsterven.

Hoe Votrient in te nemen?

Votrient is een behandeling in pilvorm. Het geneesmiddel is beschikbaar in pillen van 400 mg en 200 mg. Votrient is enkel te verkrijgen via de ziekenhuisapotheek.

De dosis bedraagt meestal 800 milligram (2 x400 milligram) per dag.

De voorgeschreven dosis Votrient moet éénmaal daags worden ingenomen en dit op een nuchtere maag.

Dit betekent ofwel 1 uur voor ofwel 2 uur na de maaltijd.

Probeer Votrient steeds rond hetzelfde tijdstip van de dag in te nemen.



Drink of eet tijdens de behandeling met Votrient geen pompelmoes of pompelmoessap. Dit kan de nevenwerkingen van de therapie doen toenemen! Neem ook geen sint-janskruid (Hypericum perforatum) tijdens de therapie; dit vermindert de werking van Votrient. Ook echinacea is te vermijden.

Als u een dosis vergeet in te nemen, haal deze dan niet in maar neem de volgende dag gewoon de gebruikelijke dosering verder in.

Nevenwerkingen

Bijwerkingen kunnen op elk tijdstip van de behandeling optreden en zijn dus veelal niet te voorspellen in de tijd. De meeste bijwerkingen kunnen goed worden behandeld, maar het is erg belangrijk uw arts tijdig te informeren zodat bijwerkingen in een vroeg stadium kunnen worden aangepakt.

Frekwente bijwerkingen

- Vermoeidheid en futloosheid.
- Ontstekingen van de mond (irritatie, pijn, kleine zweertjes).
Gebruik preventief een zachte tandenborstel. Gebruik preventief een ontsmettende mondspoeling zoals Hextril of Corsodyl. Neem bij uitgesproken mondlast snel contact op met uw arts of begeleidend verpleegkundige.
- Smaak verandering, verlies van eetlust.
- Misselijkheid of braken. Maag last.
Gebruik frequent kleinere maaltijden. U mag hiervoor steeds Motilium instant smelttabletten tot 3 per dag nemen.
- Diarree.
Bij diarree mag u Imodium tot 6 per dag innemen. Als de diarree echter erg uitgesproken is of langer dan 24 uur aanhoudt, dan neemt u best contact op met uw verpleegkundige of arts.
- Verkleuring van de huid (gelig) of haar (grijs door pigment verlies), roodheid, droge huid, blaren op handpalmen en voetzolen (hand-voetsyndroom), huiduitslag. Het haar kan soms verdunnen; volledige haaruitval is zeer zeldzaam.
- Verhoogde bloeddruk, hoofdpijn.
Laat tijdens de deze therapie regelmatig uw bloeddruk controleren!

- Dalen van de witte bloedcellen. Witte bloedcellen beschermen ons tegen infecties. Lage witte bloedcellen betekent een verhoogd risico op infecties (soms ernstig!). Ingeval van koorts en/of een infectie moet u **onmiddellijk** contact op te nemen met uw huisarts of uw arts in het ziekenhuis of gaat u meteen naar de dienst spoedgevallen.
- Dalen van de bloedplaatjes met een verhoogd risico op bloedingen. Verwittig onmiddellijk uw arts of huisarts bij bv. frequente neusbloeding, bloedend tandvlees, blauwe plekken...
- Licht verhoogde kans op arteriële trombose.
- Afwijkende leverwaarden in het bloed. Daarom zal er op regelmatige tijdstippen een bloedafname worden gepland.
- Vertraagde genezing van een wonde

Minder frequente bijwerkingen

- Verminderde werking van de schildklier
- Hoofdpijn
- Spierzwakte
- Verhogen of verlagen van de bloedsuikerspiegels

Als u een nevenwerking ondervindt, contacteer dan onmiddellijk uw arts of begeleidend verpleegkundige in het ziekenhuis om te vermijden dat de nevenwerkingen ernstig worden!!!!

Interactie met medicatie

Votrient mag NIET worden gecombineerd met tal van andere medicijnen aangezien dit soms de nevenwerkingen kan doen toenemen of in andere gevallen de werking van Votrient kan doen verminderen.

Meld steeds alle medicatie (ook kruiden en/of homeopathische middelen!!) aan uw arts.

Aanpassingen van de medicatie of opstarten van andere medicatie moet steeds in overleg met uw arts gebeuren.

Bij vragen of ongemakken kunt u contact opnemen met uw arts of verpleegkundige: zie telefoonlijst in uw informatiegids.

