Medicatie sunitinib Sutent®

Beste patiënt

Uw arts heeft u volgende behandeling voorgesteld: Sutent. We geven u graag wat meer informatie. We wensen u veel succes en goede moed met uw behandeling.

De dienst oncologie

Wat is Sutent?

De werkzame stof van Sutent® is sunitinib. Sunitinib belet de groei van kankercellen en doet dit door onder andere de bloedvatvorming af te remmen of zelfs te stoppen. De tumor krijgt op deze manier minder zuurstof en voedingstoffen.

Hoe in te nemen?

Sutent is een behandeling in pilvorm. Het geneesmiddel is beschikbaar in capsules van 50 mg, 25 mg en 12.5 mg. De capsules hebben een verschillende kleur naargelang de dosis.

De voorgeschreven dosis Sutent dient éénmaal daags te worden ingenomen via de mond, met of zonder voedsel.
Probeer Sutent steeds rond hetzelfde tijdstip van de dag in te nemen.

De duur van de therapie bedraagt 2 weken gevolgd door 1 week rustperiode. Tijdens deze rustperiode neemt u geen Sutent in.
De dosis die u moet innemen is .....mg per dag.

Neem Sutent echter NIET in met pompelmoes of pompelmoessap. Dit kan de nevenwerkingen van de therapie doen toenemen! Neem ook geen sint-janskruid (Hypericum perforatum) tijdens de therapie; dit vermindert de werking van Sutent.

Ams u een dosis vergeet in te nemen, haal deze dan niet in (geen extra capsules innemen) maar neem de volgende dag gewoon de gebruikelijke dosering verder in.

azdelta
Uw ziekenhuis.

Deze brochure is laatst aangepast op 04/01/2023 0520 5952-NL

Bewaar de geneesmiddelen op kamertemperatuur en zorg zeker dat ze buiten het bereik van kinderen bewaard worden. Bewaar in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen vocht.

Bijwerkingen

Bijwerkingen kunnen op elk tijdstip van de behandeling optreden en zijn dus veelal niet te voorspellen in de tijd. De meeste bijwerkingen kunnen goed worden behandeld, maar het is erg belangrijk uw verpleegkundige of arts tijdig te informeren zodat bijwerkingen in een vroeg stadium kunnen worden aangepakt.

Frequente bijwerkingen

- Verhoogde bloeddruk, hoofdpijn.
  Laat tijdens deze therapie regelmatig uw bloeddruk controleren!
- Vermoeidheid en futloosheid.
- Ontstekingen van de mond (irritatie, pijn, kleine zweertjes).
  Gebruik preventief een zachte ipv een harde tandenborstel. Gebruik preventief een ontsmettende mondspoeling zoals Perio-Aid. Neem bij uitgesproken mondlast snel contact op met uw verpleegkundige of arts.
- Smaakverandering, verlies van eetlust.
- Misselijkheid of braken. Maaglast.
  Gebruik frequent kleinere maaltijden. U mag hiervoor steeds Motilium instant smelttabletten tot 6 per dag nemen.
- Diarree of soms verstopping (constipatie).
  Bij diarree mag u Imodium tot 6 per dag innemen. Als de diarree echter erg uitgesproken is of langer dan 24 uur aanhoudt, dan verwittigt uzo snel mogelijk uw arts. Ingeval van harde of moeilijke stoelgang kan u Forlax tot 3 zakjes per dag innemen (op te lossen in een glas water) of Movicolsiroop.
- Verkleuring van de huid (gelig) of haar (grijs door pigmentverlies)
- Dalen van de witte bloedcellen.
  Witte bloedcellen beschermen ons tegen infecties. Lage witte bloedcellen betekent een verhoogd risico op infecties (soms ernstig!). Ingeval van koorts en/of een infectie moet u **onmiddellijk** contact opnemen met uw huisarts of arts in het ziekenhuis of gaat u meteen naar de dienst spoedgevallen.

- Het hand-voetsyndroom.
  Hierbij raken de handen en voeten rood en opgezwollen met pijn, tintelingen, kloven en zweertjes. Waarschuw uw verpleegkundige of arts als u deze verschijnselen krijgt. Om deze bijwerking te voorkomen kan het zinvol zijn de handen en voeten te koelen tijdens de behandeling door ze in koud water te dompelen. Vet de handen in met een verzachtende crème, maar wrijf niet omdat dan eerder blaren ontstaan.

Minder frequente bijwerkingen

- Verminderde werking van de schildklier.
- Neusbloeding, abnormaal gekleurde urine, overmatige traanafscheiding.
- Verminderde hartwerking, kortademigheid.
- Gewrichtspijn, spierpijn, ophouden van vocht.

Aandachtspunten

Sutent mag NIET worden gecombineerd met tal van andere medicijnen aangezien dit soms de nevenwerkingen kan doen toenemen of in andere gevallen de werking van Sutent kan doen verminderen.
Meld steeds alle medicatie (ook kruiden en/of homeopathische middelen!) aan uw behandelend arts.
Aanpassingen van de medicatie of opstarten van andere medicatie moet steeds in overleg met uw arts in het ziekenhuis gebeuren.