

Taxotere (= Docetaxel) wekelijks

Beste patiënt(e)

Uw arts heeft u deze behandeling voorgesteld. Via deze folder geven we u graag meer uitleg.

We wensen u veel succes en moed toe met uw behandeling!

De diensten oncologie en hematologie

Wat is Taxotere?

- Het bevat het celremmend geneesmiddel Docetaxel.
- Voor patiënten met een longkanker

Hoe werkt Taxotere?

Taxanen zoals docetaxel verstoren de celstructuur waardoor de celdeling niet meer goed plaatsvindt.

- In elke cel bevinden zich kleine buisvormige structuren.
- Deze buisjes maken deel uit van het ‘geraamte’ van de cel en zijn belangrijk bij de celdeling.
- Docetaxel verstoort de aanmaak van deze buisvormige structuren door enerzijds de aanmaak ervan aan te wakkeren en anderzijds te verhinderen dat bestaande worden afgebroken.
- Hierdoor verstikt de cel als het ware en kan hij zich niet meer delen.

Waar en hoe wordt Taxotere toegediend?

- De therapie wordt via het oncologisch dagziekenhuis toegediend.
- U moet niet nuchter binnenkomen tenzij anders werd gevraagd.
- U krijgt gedurende 3 opeenvolgende weken therapie en dan 1 weekje rust, om daarna opnieuw hetzelfde te herhalen.
- Meestal zullen 4 tot 6 cycli gegeven worden (afhankelijk van het resultaat en hoe goed u de behandeling verdraagt)
- Het product wordt via een infuus toegediend langs een ader of via een poortcatheter/PICC
- Aangezien de therapie broosheid en afbrokkelen van



nagels kan veroorzaken is het belangrijk je nagels en nagelriem in te smeren met hydraterende crème.

- Het is belangrijk dat u voor de behandeling uw medicatie inneemt: 1 Medrol 32 mg de dag voordien bij het ontbijt en ook 's morgens vóór de start van de therapie.
- Voor de eigenlijke toediening van de chemo krijgt u medicatie om misselijkheid te voorkomen (Litan)
- Voor en na de therapie wordt er een spoelinfuus toegediend.
- De eigenlijke therapie gebeurt via een chemopomp, zodat de juiste dosis over de juiste tijdsperiode inloopt.
- Vóór elke toediening van een nieuw product vraagt de verpleegkundige uw naam en geboortedatum.
- De verpleegkundige controleert ook de terugvloeit van bloed in uw infuusleiding.
- Bij elke manipulatie van de chemo draagt de verpleegkundige handschoenen uit veiligheidsoverwegingen.

Wat zijn de mogelijke bijwerkingen?

- Vermoeidheid
- Misselijkheid/braken
- Vochtophoping in de weefsels (zwellen handen, voeten, benen...)
- Volledige haaruitval (start ongeveer 3 weken na de toediening)
- Ontsteking van mondslijmvlies (blaasjes in mond, aften)
- Invloed op de bloedcellen (rode, witte en bloedplaatjes)
- Nagelaandoeningen (verkleuring)
- Diarree/obstipatie
- Huidaandoeningen (roodheid, droogte en eventueel vervelling)
- Overgevoeligheidsreacties tijdens het inlopen van het product (beklemmend gevoel op de borst, griepsyndroom, jeuk, ademnood)
- Spierpijn en zwakte
- Tranende en geïrriteerde ogen

Nabehandeling thuis en praktische info

- We raden blootstelling aan de zon af en adviseren om zonneproducten met hoge beschermingsfactor (50+) te gebruiken en ook een hoofddeksel te dragen.
- Om blootstelling aan chemotherapie te voorkomen bij seksueel verkeer,

is het belangrijk tot 7 dagen na de toediening van de chemotherapie een voorbehoedsmiddel te gebruiken.

- Bij uw vertrek uit het ziekenhuis krijgt u een volgende afspraak mee en ook een overzicht van de nog te nemen medicatie.
- Afhankelijk van uw bloedresultaten en uw algemene toestand bestaat de kans dat uw behandeling voor enkele dagen wordt uitgesteld of dat er een aanpassing van de dosis nodig is.
- Medicatie tegen misselijkheid krijgt u mee, samen met het innameschema.
- Meestal wordt na 2 volledige cycli een CT-thorax gepland.
- Vóór elke toediening gebeurt er altijd een bloedafname in het ziekenhuis of via de huisarts.
- Mannelijke patiënten raden we aan zittend te plassen.
- Na elke toiletbeurt doet u het toiletdeksel dicht en spoelt u 2 keer door.
- Goede opvolging van het stoelgangspatroon is nodig omdat sommige medicatie opstoppend werkt.
- De verpleegkundig consulent begeleidt u in het verder verloop van de behandeling.
- De sociaal assistente komt langs bij de opstart van de therapie om info te geven over mogelijke tegemoetkomingen, reiskosten, sociale voorzieningen, enz.
- De diëtiste komt langs bij de opstart en tijdens de behandelingen. Zij geeft tips en voedingsadviezen.
- **Goede opvolging van uw temperatuur is héél belangrijk!!** Bij een verhoging boven de 38 graden neemt u steeds contact op met uw huisarts of met uw arts in het ziekenhuis.
- Nauwkeurige beschrijving en nuttige tips in kader van de bijwerkingen vindt u in uw infomapje.
- Bij vragen, problemen of ongerustheid: aarzel niet om contact met ons op te nemen (zie telefoonlijst in uw infomapje)