Taxotere (= Docetaxel) wekelijks

Beste patiënt(e)

In deze brochure geven we graag meer informatie over de behandeling die je arts heeft voorgesteld: Taxotere wekelijks.

We wensen je veel succes en moed toe en staan voor je klaar tijdens je behandeling.

De diensten oncologie en hematologie

Wat is Taxotere?

- Een geneesmiddel voor chemotherapie dat het celremmend geneesmiddel Docetaxel bevat.
- Deze medicatie wordt gebruikt voor patiënten met een longkanker.

Hoe werkt Taxotere?

In elke cel bevinden zich kleine buisvormige structuren. Deze buisjes maken deel uit van het 'geraamte' van de cel en zijn belangrijk bij de celdeling.

Docetaxel verstoort de aanmaak van die buisvormige structuren door enerzijds de aanmaak ervan aan te wakkeren, en anderzijds te verhinderen dat bestaande structuren worden afgebroken. Hierdoor kunnen kankercellen niet verder delen en sterven ze af.

azdelta

Deze brochure is laatst aangepast op 19/10/2026 0520 5408-NL

Waar en hoe wordt Taxotere toegediend?

- De therapie gebeurt in het **oncologisch dagziekenhuis**.
- Je hoeft niet nuchter te zijn, tenzij dit expliciet wordt gevraagd.
- Je krijgt 3 opeenvolgende weken therapie en dan 1 weekje rust. Daarna herhalen we deze cyclus.
- De behandeling bestaat meestal uit 4 tot 6 cyclussen, afhankelijk van het resultaat en hoe goed je de behandeling verdraagt.
- Je krijgt de therapie via een infuus toegediend in een ader of via een poortcatheter/PICC.
- De therapie kan je nagels broos maken en ervoor zorgen dat ze afbrokkelen. Daarom is het belangrijk om je nagels en nagelriem voor de behandeling goed in te smeren met een hydraterende crème.
- Neem 1 Medrol 32 mg vóór je therapie:
  - de dag voor je therapie bij het ontbijt en avondmaal
  - de ochtend van de opstart van je therapie
- Voor we de behandeling starten, krijg je medicatie (Litican) om misselijkheid te voorkomen.
- Voor en na de therapie krijg je een spoelinfuus.
- Je krijgt de chemobehandeling via een chemopomp. zodat de juiste dosis over de juiste tijdspanne kan toegediend worden:
- Vóór het toedienen van een nieuw product vraagt de verpleegkundige telkens je naam en geboortedatum.
- De verpleegkundige controleert ook de terugvloei van bloed in je infuusleiding.
- Bij elke aanraking met de chemomedicatie draagt de verpleegkundige handschoenen uit veiligheid

Wat zijn de mogelijke bijwerkingen?

- Vermoeidheid
- Misselijkheid/braken
- Vochtophoping die zorgt voor gezwollen handen, voeten, benen...
- Volledige haaruitval (start ongeveer 3 weken na de chemo)
- Blaasjes in je mond of aften door ontsteking van het mondslijmvlies
- Invloed op de bloedcellen (rode, witte en bloedplaatjes)
- Nagelaandoeningen (verkleuring)
- Diarree/verstopping (obstipatie)
- Huidaandoeningen (roodheid, droogte en eventueel vervelling)
- Overgevoeligheidsreacties wanneer je de chemo krijgt (beklemmend gevoel op de borst, griepsyndroom, jeuk, ademnood)
- Spierpijn en een zwak gevoel
- Tranende en geïrriteerde ogen

Nabehandeling thuis en praktische info

- Na je eerste week chemotherapie krijg je een inspuiting met **Lonquex**, door een thuisverpleegkundige. Je krijgt dit spuitje mee vanuit het ziekenhuis.
- We geven je medicatie tegen **misselijkheid** mee, samen met het innameschema.

- Vermijd blootstelling aan **de zon**, gebruik zonneproducten met een hoge beschermingsfactor (50+) en draag een hoofddeksel.
- Resten van de chemotherapie kunnen nog enkele dagen aanwezig zijn in je lichaam. Gebruik daarom tot 7 dagen na je therapie een **voorbehoedsmidde**l bij seksueel contact.
- Doe het **toilet**deksel dicht na elke toiletbeurt en spoel 2 keer door. Mannelijke patiënten raden we aan zittend te plassen.
- Volg je **stoelgang** goed op, sommige medicatie kan zorgen voor obstipatie.
- Controleer regelmatig je **lichaamstemperatuur.** Neem bij een verhoging boven de 38 graden altijd contact op met je huisarts of specialist.

- De **verpleegkundig consulent** begeleidt je tijdens je behandeling.
- De **sociaal assistente** komt langs bij de opstart van de therapie om info te geven over mogelijke tegemoetkomingen, reiskosten, sociale voorzieningen, enz...
- De **diëtiste** geeft tips en voedingsadviezen bij je therapie.

- Bij je vertrek uit het ziekenhuis leggen we een volgende afspraak vast en krijg je een overzicht de medicatie die je nog moet nemen.
- Afhankelijk van je bloedresultaten en algemene toestand bestaat de kans dat je behandeling voor enkele dagen wordt uitgesteld of dat er een aanpassing van de dosis nodig is.
- Meestal plannen we na 2 volledige cyclussen een CT van de borst.
- Vóór elke therapie nemen we bloed af in het ziekenhuis of via de huisarts.

- In je infomapje vind je:
  - een nauwkeurige beschrijving en nuttige tips over bijwerkingen.
  - een telefoonlijst om ons te contacteren bij vragen, problemen of als je ongerust bent.