

Taxotere (Docetaxel) 3-wekelijks

Beste patiënt(e),

In deze folder geven we meer uitleg over een behandeling met Taxotere.

We wensen u veel succes en moed toe met uw behandeling!

De diensten oncologie en hematologie

Wat is Taxotere?

- Bevat het celremmend geneesmiddel Docetaxel.
- Voor patiënten met longkanker

Hoe werkt Taxotere?

Taxanen zoals docetaxel verstoren de celstructuur en daardoor ook de celdeling.

- In elke cel bevinden zich kleine buisvormige structuren.
- Deze buisjes maken deel uit van het 'geraamte' van de cel en zijn belangrijk bij de celdeling.
- Docetaxel verstoort de aanmaak van buisvormige structuren door enerzijds de aanmaak ervan aan te wakkeren en anderzijds te verhinderen dat bestaande structuren worden afgebroken.
- Hierdoor verstikt de cel als het ware en kan hij zich niet meer delen.

Waar en hoe wordt Taxotere toegediend?

- De toediening gebeurt via het oncologisch dagziekenhuis.
- U moet niet nuchter binnenkomen tenzij anders werd gevraagd.
- U krijgt normaalgezien om de 3 weken therapie.
- Meestal zullen 4 tot 6 cycli gegeven worden (afhankelijk van resultaat en hoe goed u de behandeling verdraagt)
- Het product wordt via een infuus toegediend langs een ader of via een poortcatheter/ PICC.
- Aangezien de therapie broosheid en het afbrokkelen van nagels kan veroorzaken is het belangrijk uw nagels en



nagelriem vooraf goed in te smeren met een hydraterende crème.

- Belangrijk is dat u op voorhand uw medicatie inneemt: 1 Medrol 32 mg de dag voordien bij het ontbijt en avondmaal en op de ochtend van de opstart van de therapie.
- Voor het opstarten van de chemo krijgt u Litican, medicatie om misselijkheid te voorkomen.
- Voor en na de therapie voorzien we een spoelinfuus.
- De toediening van de therapie gebeurt via een chemopomp. Zo kan de juiste dosis over de juiste tijdspanne inlopen.
- Voor de toediening van een nieuw product vraagt de verpleegkundige naar uw naam en geboortedatum.
- De verpleegkundige controleert ook de terugvloeï van bloed in uw infuusleiding.
- Bij elke manipulatie van de chemo draagt de verpleegkundige handschoenen uit veiligheidsoverwegingen.

Wat zijn de mogelijke nevenwerkingen?

- Vermoeidheid
- Misselijkheid / braken
- Vochtophoping (zwellend van handen, voeten, benen...)
- Volledige haaruitval (start ongeveer 3 weken na de opstart)
- Ontsteking van het mondslijmvlies (blaasjes in mond, afters)
- Invloed op de bloedcellen (rode, witte en bloedplaatjes)
- Nagelaandoeningen (verkleuring)
- Diarree / obstipatie
- Huidaandoeningen (roodheid, droogte en eventueel vervelling)
- Overgevoelighedsreacties tijdens het inlopen van het product (beklemmend gevoel op de borst , griepsyndroom, jeuk, ademnood)
- Spierpijn en zwakte
- Tranende en geïrriteerde ogen

Nabehandeling thuis en praktische info

- Vermijd blootstelling aan de zon, gebruik zonneproducten met hoge beschermingsfactor (50+) en draag een hoofddekseel in de zon.
- Om blootstelling aan chemotherapie te voorkomen bij seks, is het belangrijk tot 7 dagen na de toediening van de chemotherapie een voorbehoedsmiddel te gebruiken.
- Bij uw vertrek uit het ziekenhuis krijgt u een volgende afspraak mee en ook een overzicht van de nog te nemen medicatie.
- Afhankelijk van uw bloedresultaten/uw algemene toestand bestaat de kans dat uw behandeling voor enkele dagen wordt uitgesteld of dat er een aanpassing van de dosis nodig is.
- Medicatie tegen misselijkheid (Litican) krijgt u mee naar huis, samen met het innameschema.
- Normaalgezien plannen we na 2 volledige cycli een CT thorax.
- Vóór elke toediening gebeurt altijd een bloedafname in het ziekenhuis of via huisarts op dag 8 en dag 15
- Mannelijke patiënten raden we aan zittend te plassen.
- Na elke toiletbeurt doet u het toiletdekseel dicht en spoelt u 2 keer door.
- Goede opvolging van het stoelgangspatroon is nodig omdat sommige medicatie opstopping kunnen veroorzaken.
- De verpleegkundig consulent begeleidt u in het verdere verloop van de behandeling.
- De sociaal assistente komt langs bij de opstart van de therapie om u te informeren over mogelijke tegemoetkomingen, reiskosten, sociale voorzieningen, enz...
- De diëtiste geeft bij de opstart en tijdens de behandelingen tips en voedingsadviezen
- **Goede opvolging van uw temperatuur is héél belangrijk! Neem altijd contact op met uw huisarts of arts in het ziekenhuis bij een verhoging boven de 38 graden.**
- Een nauwkeurige beschrijving en nuttige tips over de bijwerkingen vindt u in uw infomapje.
- Bij vragen, problemen of ongerustheid aarzel niet om contact met ons op te nemen (zie telefoonlijst in uw infomapje)

