# Taxotere (Docetaxel) 3-wekelijks

Beste patiënt(e),

In deze folder geven we meer uitleg over een behandeling met Taxotere. We wensen je veel succes en moed toe en staan voor je klaar tijdens je behandeling.

De diensten oncologie en hematologie

## Wat is Taxotere?

Taxotere is een behandeling voor patiënten met longkanker dat Docetaxel bevat. Docetaxel remt de celdeling om zo kankercellen te bestrijden.

## Hoe werkt Taxotere?

In elke cel bevinden zich kleine buisvormige structuren. Deze buisjes maken deel uit van het 'geraamte' van de cel en zijn belangrijk bij de celdeling. Docetaxel verstoort de aanmaak van buisvormige structuren door enerzijds de aanmaak ervan aan te wakkeren en anderzijds te verhinderen dat bestaande structuren worden afgebroken. Zo verstikt de cel en kan hij zich niet meer delen.

azdelta

**Deze brochure is laatst aangepast op 13/11/2026** 0520 5407-NL

## Waar en hoe wordt Taxotere toegediend?

- De therapie gebeurt normaalgezien om de **3 weken** in het oncologisch dagziekenhuis.
- Je hoeft **niet nuchter** te zijn tenzij dit wordt gevraagd.
- Meestal voorzien we 4 tot 6 cycli, afhankelijk van hoe de kanker reageert en hoe goed je de behandeling verdraagt.
- Neem **1 Medrol 32 mg**:
  -de dag voor je therapie bij het ontbijt en avondmaal
  -op de ochtend van de opstart van de therapie
- Je krijgt de behandeling via **een infuus** in een ader in je arm of via een **poortcatheter/PICC**. Dit gebeurt met een chemopomp zodat de juiste dosis over de juiste tijdspanne kan toegediend worden.
- Voor en na de behandeling krijg je **een spoelinfuus**. Voor de behandeling krijg je ook medicatie tegen **misselijkheid** (Litican).
- Aangezien de therapie broosheid en het afbrokkelen van nagels kan veroorzaken is het belangrijk om je nagels en nagelriem vooraf goed in te smeren met een **hydraterende crème**.
- .De verpleegkundige:
  -Vraagt telkens je naam en geboortedatum voor het geven van een nieuw product
  -Controleert het teruglopen van bloed in je infuusleiding.
  -Draagt handschoenen bij elke handeling met de chemotherapie.

## Wat zijn mogelijke nevenwerkingen?

- Vermoeidheid
- Misselijkheid/braken
- Vochtophoping (zwelling van handen, voeten, benen...)
- Volledige haaruitval, meestal vanaf 3 weken na de start van de therapie
- Ontsteking van het mondslijmvlies (blaasjes in mond, aften)
- Invloed op de bloedcellen (rode, witte en bloedplaatjes)
- Nagelaandoeningen (verkleuring)
- Diarree/overstopping
- Huidaandoeningen (roodheid, droogte en eventueel vervelling)
- Overgevoeligheidsreacties tijdens het inlopen van het product (beklemmend gevoel op de borst , griepsyndroom, jeuk, ademnood)
- Spierpijn en zwakte
- Tranende en geïrriteerde ogen

## Nabehandeling thuis en praktische info

• Neem **1 Medrol 32 mg**:
  Als je thuiskomt, bij het avondeten
  De dag na je behandeling, 's morgens en 's avonds
• Je krijgt medicatie mee naar huis tegen **misselijkheid** (Litican) en een spuitje **Lonquex**. Een thuisverpleegkundige moet dit spuitje geven 24 uur na je behandeling.
• Vermijd blootstelling aan de **zon**, gebruik zonneproducten met hoge beschermingsfactor (50+) en draag een hoofddeksel.
• Resten van de chemotherapie kunnen nog enkele dagen aanwezig zijn in je lichaam. Gebruik daarom tot 7 dagen na je therapie een **voorbehoedsmiddel** bij seksueel contact.
• Doe het **toiletdeksel** dicht na elke toiletbeurt en spoel 2 keer door. Mannelijke patiënten raden we aan zittend te plassen.
• Volg je **stoelgang** goed op, sommige medicatie kan zorgen voor obstipatie.
• Controleer regelmatig je **lichaamstemperatuur**. Neem bij een verhoging boven de 38 graden altijd contact op met je (huis)arts.

• De **verpleegkundig consulent** begeleidt je tijdens je behandeling.
• De **sociaal assistent** komt langs bij de opstart van de therapie om info te geven over mogelijke tegemoetkomingen, reiskosten, sociale voorzieningen, enz.
• De **diëtiste** geeft tips en voedingsadviezen bij je therapie.

• Bij je vertrek uit het ziekenhuis leggen we een **volgende afspraak** vast en krijg je een overzicht van de medicatie die je nog moet nemen.
• Afhankelijk van je bloedresultaten en algemene toestand bestaat de kans dat je behandeling voor enkele dagen wordt uitgesteld of dat er een aanpassing van de dosis nodig is.
• Meestal plannen we na 2 volledige cyclussen een **CT van de borst**.
• Vóór elke therapie nemen we **bloed** af in het ziekenhuis of via de huisarts op dag 8 en dag 15.

In je **infomapje** vind je:
- een nauwkeurige beschrijving en nuttige tips over bijwerkingen.
- een telefoonlijst om ons te contacteren bij vragen, problemen of als je ongerust bent