Medicatie enzalutamide (Xtandi®)

Beste patiënt

Uw arts heeft u volgende behandeling voorgesteld: Xtandi. We geven u graag wat meer informatie. We wensen u veel succes en goede moed met uw behandeling.

De dienst oncologie

Wat is Xtandi?

Xtandi bevat de werkzame stof enzalutamide. Xtandi wordt gebruikt voor de behandeling van volwassen mannen met prostaatkanker die is uitgezaaid naar andere lichaamsdelen.

Hoe werkt Xtandi?

Xtandi is een geneesmiddel dat werkt door de activiteit van hormonen, genaamd androgenen (zoals testosteron), te blokkeren. Door het blokkeren van androgenen zorgt enzalutamide ervoor dat prostaatkankercellen niet meer groeien en delen.

Hoe neemt u Xtandi in?

De aanbevolen dosering is 160 mg (vier capsules) die eenmaal per dag op hetzelfde tijdstip ingenomen worden.

Innemen van Xtandi
- Slik de capsules in hun geheel door met water.
- Kauw niet op de capsules, los ze niet op en open ze niet voordat u ze doorslikt.
- Xtandi kan met of zonder voedsel worden ingenomen

azdelta
Uw ziekenhuis.

Deze brochure is laatst aangepast op 04/01/2023 0520 6170-NL

Hebt u te veel van dit middel ingenomen?
Stop met het gebruik van Xtandi en neem contact op met uw arts als u meer capsules hebt ingenomen dan voorgeschreven.

Bent u vergeten dit middel in te nemen?
- Als u vergeet Xtandi in te nemen op het gebruikelijke tijdstip, dan neemt u uw gebruikelijke dosis in zodra u eraan denkt.
- Als u de hele dag bent vergeten Xtandi in te nemen, neem dan uw gebruikelijke dosis de volgende dag in.
- Neem direct contact op met uw arts als u langer dan één dag bent vergeten Xtandi in te nemen.
- Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Bijwerkingen

Een behandeling met Xtandi wordt door de meeste patiënten vrij goed verdragen. Toch kan het product verantwoordelijk zijn voor een aantal onaangename nevenwerkingen.

- vermoeidheid
- hoofdpijn
- opvliegers
- hoge bloeddruk

in mindere mate
- vallen
- angstig voelen
- droge huid, jeuk
- moeite met onthouden
- borstvergroting bij mannen
- oncontroleerbare drang om de benen te bewegen
- hallucinaties,
- moeite met helder nadenken

Zeldzaam
- epilepsie: neem zo snel mogelijk contact op met uw arts als u een aanval hebt. Neem geen Xtandi meer in.

Aandachtspunten

Xtandi mag NIET worden gecombineerd met een aantal van andere medicijnen gezien dit soms de nevenwerkingen kan doen toenemen of in andere gevallen de werking van de Xtandi kan doen verminderen.
Meld steeds alle medicatie (ook kruiden en/of homeopathische middelen) aan uw arts.
Aanpassingen van de medicatie of opstarten van andere medicatie dient steeds in overleg met uw behandelend arts te gebeuren.

Bij vragen of ongemakken kunt u contact opnemen met uw arts of verpleegkundige: zie telefoonlijst in uw informatiegids.