

Toediening Injectafer®

Tijdens de zwangerschap of na de bevalling

Je behandelende arts heeft je een behandeling met Injectafer® voorgeschreven. Deze folder geeft je informatie over het geneesmiddel, hoe de toediening verloopt en welke bijwerkingen mogelijk zijn. Mocht je na het lezen van deze folder nog vragen hebben, stel ze gerust aan je arts of de vroedvrouw.

1. Wat is Injectafer®?

Ijzer haal je uit voeding. Een evenwichtige en gevarieerde voeding met veel groenten en fruit en voldoende ijzerhoudende voedingsmiddelen (vlees, vis, gevogelte, granen en peulvruchten) volstaat om voldoende ijzer op te nemen. De belangrijkste functie van ijzer is het zuurstoftransport door ons lichaam als bouwsteen van hemoglobuline dat in rode bloedcellen aanwezig is. Zonder ijzer is het **zuurstoftransport** niet mogelijk en een ijzertekort kan aanleiding geven tot **bloedarmoede** (anemie).

Ijzertekort kan ook ontstaan in de **zwangerschap** doordat de ijzerbehoefte stijgt of na het verlies van een grotere hoeveelheid bloed, zoals bij een **bevalling**.

Injectafer® is een geneesmiddel dat we via een **infuus** toedienen om een ijzertekort te behandelen wanneer ijzertabletten (orale ijzerpreparaten) niet werken of niet worden verdragen. Met deze behandeling worden de ijzertekorten in je lichaam opnieuw aangevuld.



2. Behandeling

Injectafer® is uitsluitend op doktersvoorschrift verkrijgbaar en dienen we toe op de afdeling.

Voorafgaand aan de behandeling bepalen we de benodigde dosis aan de hand van een **bloedname**. Het is belangrijk rekening te houden met de medicatie die al genomen wordt, aanwezigheid van een infectie, allergieën of een reactie/ziekte in de voorgeschiedenis (astma, eczeem, immuun- of inflammatoire aandoening).

Na de inschrijving en een korte bevraging waarbij ook de **parameters** gecontroleerd worden (bloeddruk, temperatuur, hartslag), zal de vroedvrouw het infuus prikken om het te kunnen toedienen. Injectafer® wordt via een ader toegediend en duurt ongeveer **30 minuten**.

3. Mogelijke bijwerkingen

Een behandeling met Injectafer® wordt door de meeste patiënten goed verdragen. De meest voorkomende bijwerkingen zijn eerder mild van aard en verdwijnen na een korte tijd: hoofdpijn, duizeligheid, hoge bloeddruk, misselijkheid, buikpijn, constipatie, diarree, reactie op de prikplaats, gevoelloosheid of een tintelend gevoel van de huid.

Allergische klachten die kunnen optreden gaan van huiduitslag en jeuk, tot kortademigheid en dalende bloeddruk bij een ernstige allergische reactie. De vroedvrouw controleert daarom ook de bloeddruk, hartslag en temperatuur om eventuele reacties op Injectafer® vast te stellen.

Overgevoelighedsreacties zijn zeer zeldzaam en het wel of niet optreden van bijwerkingen zegt echter niets over de werking van het geneesmiddel.

Wanneer er een overgevoelighedsreactie optreedt tijdens de toediening, wordt de behandeling onmiddellijk stopgezet en wordt de behandelende arts op de hoogte gebracht.

Als je je tijdens de behandeling **onwel** zou voelen, verwittig dan zo snel mogelijk de vroedvrouw. Mocht je je na de behandeling thuis onwel

voelen, neem dan contact op met je huisarts.

De toediening van Injectafer® dient voorzichtig te gebeuren om lekkage van het product (toediening naast de ader) te voorkomen. Dit kan leiden tot irritatie van de huid en mogelijk een langdurig bruine verkleuring van de huid op de plaats van de injectie. Meld daarom onmiddellijk pijn, zwelling of een branderig gevoel rond de prikplaats.

4. Contactgegevens

Kraamafdeling AZ Delta

Campus Rumbeke: 051/23.61.71

Campus Menen: 056/ 52.24.95

Campus Torhout: 050/ 23.23.71

5. Toestemmingsverklaring

Ik verklaar dat:

- Ik voldoende informatie heb gekregen over het doel, het verloop, de mogelijke risico's en alternatieven van deze behandeling.
- Ik de kans heb gekregen om vragen te stellen en dat deze naar verwachting werden beantwoord.
- Ik vrijwillig toestemming geef voor de toediening van Injectafer®.

Plaats en datum:

Handtekening patiënt
(of wettelijke vertegenwoordiger):

.....

.....

patiëntenklever