Kisplyx® (lenvatinib)

Beste patiënt

Uw arts heeft u volgende behandeling voorgesteld. Hier geven we u graag wat meer uitleg.
We wensen u veel succes en goede moed met uw behandeling.

De dienst oncologie

Wat is Kisplyx/lenvatinib?

Lenvatinib is een tyrosinekinaseremmer, een doelgerichte kankerremmende stof ('targeted therapy').
Lenvatinib remt de groei van de kankercellen en snijdt de bloedvoorziening naar die kankercellen af.
Artsen schrijven het geneesmiddel voor bij een bepaalde vorm van schildklierkanker, leverkanker, baarmoederkanker en niercelkanker.

Hoe in te nemen?

- Uw arts beslist welke dosis u moet innemen. Er zijn capsules van 10 mg en 4 mg.
- U moet de capsules elke dag op ongeveer hetzelfde tijdstip innemen. De capsules moet u volledig doorslikken met water.
- Kauw niet op de capsules en open de capsules niet.
- De capsules moet u consequent met of zonder voedsel innemen. Dus als u ze de eerste keer met voedsel inneemt, moet u dat daarna ook doen.
- Wanneer u een dosis vergeten bent en het duurt 12 uur of langer voordat u de volgende dosis moet innemen, neem dan de gemiste dosis zo snel mogelijk in. Duurt het minder dan 12 uur voordat u de volgende dosis moet innemen, neem dan de gemiste dosis niet meer in. Neem in beide gevallen de volgende dosis in op het normale tijdstip.

azdelta
Uw ziekenhuis.

Deze brochure is laatst aangepast op 11/11/2024 0520 6486-NL

- Braken vlak na de inname van Lenvatinib? Wacht met het innemen van een nieuwe dosis tot het volgende geplande tijdstip.

- De behandeling met Lenvatinib wordt verder gezet tot er sprake is van tumorgroei onder deze behandeling of als u ernstige bijwerkingen heeft.

Bijwerkingen

De meest voorkomende bijwerkingen zijn hieronder beschreven. Het is belangrijk dat u alle bijwerkingen aan uw behandelend arts en verpleegkundige vertelt. Zij kunnen u eventueel aanvullende medicijnen geven en ook adviseren op welke manier u het beste met deze bijwerkingen kunt omgaan, zodat u er minder last van hebt.

- Het kan zijn dat u als gevolg van de behandeling een **hoge bloeddruk** krijgt. Meestal merkt u daar niets van, heel soms kunt u last hebben van wazig zien of hoofdpijn. Omdat de hoge bloeddruk vaak ontstaat in het begin van de behandeling, wordt de eerste acht weken geregeld de bloeddruk gecontroleerd. Als blijkt dat uw bloeddruk verhoogd is, zal uw arts bloeddrukverlagende medicijnen voorschrijven.

- In het beenmerg worden **rode- en witte bloedcellen en bloedplaatje**s aangemaakt. Lenvatinib kan soms de aanmaak van deze bloedcellen verminderen. Witte bloedcellen zijn een onderdeel van uw afweer en beschermen u tegen infecties. Tijdens de behandeling met Lenvatinib kan een tijdelijk tekort aan witte bloedcellen ontstaan, waardoor u meer kans loopt op het krijgen van een ernstige infectie. Uw bloed zal daarom regelmatig worden gecontroleerd. Als er een tekort aan bloedplaatjes ontstaat, is er een verhoogd risico op bloedingen en op het ontstaan van blauwe plekken.

- **Maagdarmklachten**, zoals diarree, misselijkheid, braken, buikpijn, minder eetlust en afvallen.

- **Pijnlijke mond**, tong of keel, een droge mond, heesheid en smaakveranderingen.

- Door de Lenvatinib kan het **hand-voetsyndroom** ontstaan: pijnlijke, gezwollen, droge, rood verkleurde handen en voeten (vaak met een strakke huid) waarop blaren kunnen zitten. Wij raden ureumzalf of -crème aan. Daarnaast kan het helpen uw handen en voeten goed vet te houden, geen knellende schoenen te dragen en warm water te vermijden.

- Een zeer klein deel van de patiënten die behandeld wordt met Lenvatinib kan **haren verliezen.**

- **Vasthouden van vocht:** dikke enkels of voeten.

Interactie met medicatie

Lenvatinib mag NIET worden gecombineerd met tal van andere medicijnen aangezien dit soms de nevenwerkingen kan laten toenemen of de werking van Lenvatinib kan verminderen.

Meld steeds alle medicatie (ook kruiden en/of homeopathische middelen) aan uw behandelende arts.
Ook aanpassingen van medicatie of het opstarten van andere medicatie moet steeds in overleg met uw arts gebeuren.

Bij vragen of ongemakken kunt u contact opnemen met uw arts of verpleegkundige via de telefoonlijst in uw informatiegids.