Liposomaal Doxorubicine (Caelyx®)

Beste patiënt

Uw arts heeft u deze behandeling voorgesteld. Hier geven we u graag wat meer uitleg. We wensen u veel succes en goede moed met uw behandeling.

De dienst oncologie

Verloop

De chemotherapiebehandeling met Caelyx krijgt u op één bepaalde dag van de week toegediend, en dit telkens om de 2 of 4 weken. De behandelingen vinden plaats in het oncologisch dagziekenhuis.

De behandeling bestaat uit een bloedafname, een raadpleging bij uw behandelende arts en de toediening van de medicatie.
De chemotherapie krijgt u via een infuus toegediend. De infuusvloeistof is door het middel oranjerood gekleurd. De toediening van de chemotherapie duurt ongeveer 1 uur. Uw opname in het dagziekenhuis neemt een halve dag in beslag.

Het aantal behandelingen dat u krijgt, hangt af van hoe u op deze medicatie reageert.

Nevenwerkingen

Het product kan de oorzaak zijn van een aantal nevenwerkingen:

- **Misselijkheid en braken** kan voorkomen gedurende ongeveer de eerste drie dagen na uw behandeling. Daarvoor kunt u Litican innemen tot zes tabletjes per dag.
- **Rode verkleuring van de urine**. Dit is volkomen onschuldig en verdwijnt spontaan.
- **Lichte haaruitval** kan optreden. Volledige haaruitval is eerder zeldzaam.

azdelta
Uw ziekenhuis.

Deze brochure is laatst aangepast op 16/10/2025 0520 6307-NL

- **Mondslijmvliesontsteking** kan een aantal dagen na uw behandeling voorkomen. Een goede mondhygiëne is zeker aan te raden. Poets daarom uw tanden met een zachte tandenborstel. U kunt tweemaal per dag een ontsmettende mondspoeling gebruiken zoals Perio-Aid. Bij ernstige mondslijmvliesontsteking gaat u het beste naar uw huisarts of specialist, die u een speciaal mondspoelmiddel en/of medicatie zal voorschrijven.

- Uw witte bloedcellen kunnen dalen en rond de 10de tot 14de dag na uw behandeling hun laagste waarde bereiken. Dit betekent dat uw **weerstand** op dat moment verminderd is en dat u moet opletten voor mogelijke infecties. Controleer daarom regelmatig uw koorts. Bij **koorts** van meer dan 38 graden Celsius of bij tekenen van **infectie** (hoesten, branderig gevoel bij plassen ...) neemt u onmiddellijk contact op met uw arts. U moet een tweetal weken na de behandeling bloed laten prikken bij de huisarts om de weerslag van de behandeling op het bloed te evalueren.

- **Hand-voetsyndroom:** Tijdens de behandeling kunt u last krijgen van het hand-voetsyndroom. Handen en voeten zijn dan pijnlijk, rood en gezwollen en kunnen tintelen of dood aanvoelen. Ook kan de huid schilferen en kunnen er zweren of blaren op de huid ontstaan. Raadpleeg de aparte brochure over dit onderwerp.

- **Vermoeidheid**

Naspoelen

Nadat de medicatie werd toegediend, hangt de verpleegkundige nog een laatste infuuszakje met fysiologisch water aan, met de bedoeling u alle medicatie uit de infuusleiding toe te dienen. Op die manier krijgt u de voorgeschreven dosis volledig.

Nabehandeling thuis en praktische info

Als uw bloedwaarden niet goed zijn of als uw nevenwerkingen te zwaar zijn kan uw arts beslissen de behandeling uit te stellen of definitief te stoppen. Bij vragen of ongemakken kan u contact opnemen met het ziekenhuis, zie telefoonlijst in deze infogids.