

Maagevacuatietest



azdelta

Uw ziekenhuis.

Beste patiënt

In deze folder geven we u uitleg over het doen en het verloop van de maagevacuatiescintigrafie alsook wat we van u verwachten om dit onderzoek zo goed mogelijk te laten verlopen. Hebt u nog vragen? Wij geven u graag antwoord. Met vragen i.v.m. de kostprijs van dit onderzoek kunt u steeds terecht bij de dienst facturatie (051 23 76 66 of factuur@azdelta.be).

Het team nucleaire geneeskunde

1

Doel van het onderzoek

Een maagevacuatiescintigrafie is een onderzoek naar de werking van de maag. U krijgt een proefontbijt aangeboden waaraan een beperkte hoeveelheid radioactiviteit is toegevoegd. Gedurende twee uur nemen we om het half uur foto's van uw maag, die ons informatie geven over de snelheid waarmee het voedsel door de maag passeert.

2

Verloop van het onderzoek

- Voor dit onderzoek dient u **volledig nuchter** te zijn. Dit betekent dat u de avond voor het onderzoek vanaf middernacht niet meer mag eten, drinken of roken.
- U krijgt een proefontbijt waaraan een beperkte hoeveelheid radioactiviteit is toegevoegd, als onderdeel van het onderzoek. Na het ontbijt worden onmiddellijk foto's van de maag genomen terwijl u op de cameratafel ligt. Dit duurt ongeveer 5 minuten.
- Na de wachttijd van een half uur maken we opnieuw dezelfde foto's. Op die manier maken we gedurende twee uur om het half uur foto's. De wachttijd kunt u doorbrengen in de wachtzaal. Het is belangrijk dat u tussenin ter plaatse blijft en niets eet of drinkt en niet rookt. U brengt het best

een boek of wat tijdschriften mee.

3

Resultaat van het onderzoek

De arts-nuclearist beoordeelt de kwaliteit van het onderzoek, voor u de afdeling verlaat en maakt een verslag op. Dit verslag wordt doorgezonden naar uw behandelende arts. Hij/zij zal u het resultaat van het onderzoek meedelen en indien nodig de gepaste behandeling starten.

Uw foto's zijn digitaal beschikbaar op PACSonWEB via <http://rx.azdelta.be>. Om deze te bekijken vraagt u het best het referentienummer aan de verpleegkundige of het secretariaat.

4

Veiligheid en straling

- Een maagevacuatiescintigrafie wordt bij voorkeur niet uitgevoerd tijdens de zwangerschap. Laat dus zeker vooraf weten aan de verpleegkundige als u zwanger bent of zou kunnen zijn.
- Verwittig ons zeker als u borstvoeding geeft. Enkele maatregelen zijn belangrijk om bestraling bij de pasgeborene te beperken. Vooraf afkolven en de baby gedurende 24 uur na het onderzoek niet aanleggen kan een oplossing zijn. De verpleegkundige geeft u graag bijkomende informatie.
- De toegediende hoeveelheid radioactiviteit wordt steeds zo laag mogelijk gehouden zodat het risico op eventuele neveneffecten verwaarloosbaar is en niet opweegt t.o.v. de diagnostische info die het onderzoek oplevert. De stof zendt slechts gedurende een korte tijd straling uit en is na 1 dag grotendeels volledig uit het lichaam verdwenen. Daarom is het beter om de eerste 12 uur na het onderzoek langdurig nauw contact met baby's, jonge kinderen en zwangere vrouwen te vermijden. De gewone verzorging mag uiteraard wel.

Uw afspraak voor een maagevacuatiescintigrafie

Op / / om uur

Contact

Dienst nucleaire geneeskunde

☎ 051 23 77 43

Artsen

Dr. Kristien Casier

Dr. Liesbet De Ceuninck

Dr. Nele Lips

Dr. Kristoff Muylle

Dr. Evelyn Vranken

www.azdelta.be

Bron: dienst nucleaire geneeskunde