Antibiotica

Wat zijn antibiotica?

Antibiotica zijn een groep geneesmiddelen die bacteriën doden die infecties kunnen veroorzaken in het maag- en darmstelsel. Over het algemeen raden we het gebruik van antibiotica af bij patiënten met Crohn of colitis ulcerosa, tenzij absoluut noodzakelijk is.

Opstarten en dosis

Bij de start van uw behandeling doen we eerst een bloedonderzoek in het lab.
Uw arts zal de dosis en de duur van de behandeling met antibiotica vermelden. Afhankelijk van de duur van de behandeling zal een nieuwe raadpleging worden vastgelegd en zal er een nieuwe bloedafname gepland worden. Verdere opvolging zal afhankelijk zijn van de resultaten van het bloedonderzoek en uw klachten.

Te verwachten effecten

Na een paar dagen kunt u zich al beter voelen. Maar het is belangrijk dat u de voorgeschreven behandeling verder volgt. Als u te snel zou stoppen met het innemen van de pillen, kan uw infectie niet volledig genezen en kunnen de symptomen terugkeren of zelfs verergeren.

Zwangerschap en borstvoeding

Als u zwanger wenst te worden en/of borstvoeding geeft, neem dan zeker contact op met uw behandelende arts.

Verschillende antibiotica

Er bestaan verschillende vormen van antibiotica. In de onderstaande tekst worden twee antibiotica toegelicht die vaak gebruikt worden bij inflammatoire darmaandoeningen.

azdelta
Uw ziekenhuis.

0520 5519-NL 04-03-2019

Ciprofloxacine (Ciproxine®)

Toediening



- Slik de tabletten door met voldoende water. U neemt de medicatie best **tijdens de maaltijd**. Kauw niet op de tabletten, want ze smaken niet lekker.
- Probeer de tabletten iedere dag op ongeveer **hetzelfde tijdstip** in te nemen.

Belangrijk!

U mag de tabletten niet samen innemen met melk, yoghurt, verrijkte vruchtensappen zoals met calcium verrijkt sinaasappelsap.

Mogelijke bijwerkingen

Frequente bijwerkingen die kunnen optreden zijn **misselijkheid en diarree**. Verder zijn er nog een aantal zeldzame bijwerkingen beschreven. Dit is bij veel medicijnen het geval. Neem zeker contact op met uw behandelende arts als u last krijgt van bijwerkingen.

Enkele bijzonderheden

- Ciprofloxacine mag **niet** samen genomen worden met medicijnen die de werkzame stof **tizanidine** (middel tegen spasticiteit) bevatten. Dit kan echter een lage bloeddruk en slaperigheid veroorzaken.
- Ciprofloxacine mag **niet** genomen worden als er een bekende **allergie** is voor ciprofloxacine of andere chinolongeneesmiddelen
- Ciprofloxacine mag **niet** ingenomen worden met **maagzuurremmers** en/of **ijzersupplementen.**
- Er mag **geen alcohol** gedronken worden tijdens de behandeling.

Metronidazol (Flagyl®)

Toediening



- U neemt de medicatie het best **tijdens de maaltijd** en slik deze door met voldoende water. Kauw niet op de tabletten, want ze smaken niet lekker.
- Probeer de tabletten iedere dag op ongeveer **hetzelfde tijdstip** in te nemen.

Mogelijke bijwerkingen

Frequente bijwerkingen die kunnen optreden zijn **misselijkheid, braken, metaalsmaak, hoofdpijn en duizeligheid.** Verder zijn er nog een aantal zeldzame bijwerkingen beschreven. Dit is bij veel medicijnen het geval. Neem dan zeker contact op met uw behandelende arts als u last krijgt van bijwerkingen.

Enkele bijzonderheden

- Metronidazol mag **niet** gebruikt worden bij een bekende allergie voor **imidazoolderivaten**.
- Er mag **geen alcohol** gedronken worden tijdens de behandeling.
- Metronidazol mag **niet** gebruikt worden als u geneesmiddelen krijgt voor **de behandeling van alcoholisme**.
- Niet geschikt voor mensen met **glutenovergevoeligheid** (coeliakie).
- Uw **urine kan bruin/rood** verkleuren door deze geneesmiddelen.
- Als u **bloedverdunners** (coumarine) neemt zal deze dosis hoogstwaarschijnlijk aangepast worden.
- Tot slot wordt u goed opgevolgd als u **antipsychotica** neemt.

Als u nog vragen hebt over het gebruik van antibiotica of andere medicatie bij de ziekte van Crohn of bij colitis ulcerosa zijn we uiteraard bereid tot verdere inlichtingen. Zie contactgegevens in het begin van dit mapje.

Bron: IBD-verpleegkundige, 4 maart 2019