Budesonide (Budenofalk® en Entocort®)

Deze patiënten folder handelt over budesonide, dit is een medicijn die gebruikt wordt in de behandeling van inflammatoire darmziekten, zoals de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa. In deze folder krijgt u meer informatie over wat u precies te wachten staat en op welk tijdstip.

Wat is budesonide

Budesonide is een lokaal werkend corticosteroïd (cortisone) dat gebruikt wordt om de ontstekingen van de darm te behandelen.

Niet gebruiken bij

- Ernstige leverziekte (levercirrose)
- Tijdens de behandeling mag u geen pompelmoes sap drinken.

Opstarten en dosis

De aanbevolen dosis bij de start van de therapie is een dosis van 9mg per dag gedurende de eerste 4 weken van de behandeling. Dit komt overeen met 3 capsules (3 pillen) per dag. Daarna zal de dosis afgebouwd worden naar 6mg per dag (2 capsules) gedurende de volgende 4 weken en tot slot zal de dosis verminderd worden naar 3 mg per dag (1 capsules) die opnieuw gedurende 4 weken gegeven zal worden.

Toediening





De capsule(s) worden samen ‘s morgens bij het ontbijt genomen liefst met een groot glas water. Er mag niet gekauwd worden op de capsule. Indien u moeite heeft om deze door te slikken, mag u de capsule openen en het poeder met veel water innemen, zonder erop te kauwen.

azdelta
Uw ziekenhuis.

0520 5516-NL 04-03-2019

Te verwachten effecten

Twee weken na start van de behandeling is er al een effect waar te nemen. Het maximale effect zal bereikt worden na vier weken.

Mogelijke nevenwerkingen

- Rond gezicht (vollemaangezicht)
- Toename in gewicht
- Verhoogde bloedsuikerspiegel
- Verhoogde bloeddruk
- Vocht ophouden
- Ongewenste haargroei
- Onregelmatige menstruatie
- Impotentie
- Afwijkende laboresultaten
- Rode striemen op de huid
- Prikkelbare darm (dyspepsie)
- Spierkrampen
- Gezichtsstoornissen
- Nervositeit, agitatie en slapeloosheid

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Enkele bijzonderheden

- Het is aangewezen om jaarlijks een griepvaccin te laten plaatsen.
- Bij diabetespatiënten (suikerziekte) zullen de bloedglucosespiegels opgevolgd worden.
- Patiënten met glaucoom zullen goed opgevolgd worden.
- Budesonide mag nooit plots gestopt worden, maar moet steeds afgebouwd worden.
- Budesonide mag niet chronisch of langdurig gebruikt worden.

Afbouwschema

Budesonida moet geleidelijk aan afgebouwd worden.
In samenspraak met uw arts legt u de volgende raadpleging vast.
Als u vragen hebt over het afbouwschema twijfel dan niet om de IBD-verpleegkundige te contacteren.

Tijdstip	Dosis	Opmerkingen
Week 1 tem week 4	9 mg	week 2 en week 4 : telefonisch contact opnemen met IBD-verpleegkundige
Week 5 tem week 8	6 mg	
Week 9 tem week 12	3 mg	
Week 13	STOP	

Als u nog vragen hebt over het gebruik van budesonide of andere medicatie bij de ziekte van Crohn of bij colitis ulcerosa zijn we uiteraard bereid tot verdere inlichtingen. De contactgegevens vindt u vooraan in het mapje.

Bron: IBD-verpleegkundige, 4 maart 2019