Linkercoloscopie (Sigmoïdoscopie)

Beste patiënt

Binnenkort moet u een sigmoïdoscopie, ook wel een linkercoloscopie genaamd, ondergaan. Deze folder vertelt u meer over de voorbereiding en het verloop van het onderzoek.

Dienst IBD/maag-darm-leverziekten

Wat is een sigmoïdoscopie?

Een sigmoïdoscopie is een onderzoek waarbij de maag-darm-leverarts de binnenzijde van de endeldarm en het laatste stukje van de dikke darm bekijkt. Hiervoor wordt een endoscoop gebruikt, een flexibele buis met glasvezels en een camera die licht en beeld kan doorgeven.
Voor dit onderzoek wordt er **geen verdoving** gebruikt. Als u dit toch wenst, vraag dit best vooraf aan uw arts.

Waarvoor wordt dit onderzoek gebruikt?

Dit onderzoek wordt voornamelijk gebruikt voor patiënten met colitis ulcerosa. Met dit onderzoek kunnen afwijkingen van de endeldarm en het laatste stuk van de dikke darm worden opgespoord. Dit onderzoek wordt gebruikt om de slijmvlieslaag van de dikke darm te beoordelen.

Voorbereiding

Er moeten thuis **geen** voorbereidingen getroffen worden.
Umoet **niet** nuchter zijn voor dit onderzoek.

Net voor het onderzoek wordt een lavement toegediend door de verpleegkundige. Hierdoor wordt de stoelgang die aanwezig is in het laatste stukje van de dikke darm verwijderd.
Zo kan de maag-darm-lever arts de darmwand goed bekijken. Dit is belangrijk om de ernst van de ontsteking te kunnen inschatten.

azdelta
Uw ziekenhuis.

Deze brochure is laatst aangepast op 11/12/2019 0520 5844-NL

Het onderzoek

Tijdens het onderzoek ligt u op uw linkerzij. De arts brengt de endoscoop via de anus in de endeldarm en schuift die geleidelijk aan op tot in de dikke darm. U kunt samen met de arts meekijken naar de beelden van de darm. Het doorschuiven van de endoscoop in de darm kan soms pijnlijk ervaren worden. In het algemeen wordt dit onderzoek goed verdragen.
U kunt een drang voelen om naar het toilet te gaan maar dit is valse aandrang omdat er koolzuurgas(CO_2) in de darm wordt geblazen .
Dit wordt gedaan om de darm beter te ontplooien met het doel de binnenwand van de darm te kunnen visualiseren.

Na het onderzoek is nog tijd om uw vragen te stellen aan de arts.

Nazorg

Welke klachten kunt u ervaren na sigmoidoscopie?
Indien u hevige buikpijn of bloedverlies ervaart na het onderzoek kunt u best de arts en/of IBD-verpleegkundige contacteren.
Na het onderzoek mag u meteen weer autorijden.

Kostprijs

- Voor dit onderzoek wordt er geen opname aangerekend.
- De artsen zijn geconventioneerd en gebruiken bijgevolg de tarieven die erkend zijn door het RIZIV. Een prijsindicatie kan worden opgevraagd via de dienst facturatie (051 23 70 54).
- De factuur wordt opgemaakt via het ziekenhuis, in samenspraak met uw verzekeraar (derdebetalersregeling). Pas enkele weken na dit onderzoek zal u gevraagd worden om de factuur te betalen.

Contact

Bij meer vragen contacteer gerust uw behandelende arts voor meer informatie.