Mesalazine

Wat is Mesalazine (Claversal®, Colitofalk®, Pentasa®)?

Mesalazine is een medicijn dat gebruikt wordt in de behandeling van colitis ulcerosa. Het is een ontstekingsremmend geneesmiddel dat specifiek op het darmslijmvlies werkt. Dit geneesmiddel gaat lichte ontsteking tegen en voorkomt ook nieuwe opstoten van uw ziekte.

Opstart en dosis

Voor de start van de behandeling is er eerst een bloedonderzoek in het lab om uw nierfunctie te controleren. Als uw nieren goed werken, kan de behandeling starten. Twee tot vier weken na de start van uw behandeling komt u op raadpleging bij de arts. Indien nodig zal er op dat ogenblik opnieuw een bloedafname gebeuren. Uw arts kan eventueel beslissen om de dosis te verlagen indien u geen klachten meer hebt. Als alles goed gaat bestaat verdere opvolging uit een jaarlijkse raadpleging. Hier kan een bloedafname aan gekoppeld worden. Als u opnieuw klachten krijgt, kunt u steeds uw behandelende arts en/of de IBD-verpleegkundige raadplegen.

Toedieningsvorm

Mesalazine kan op twee verschillende manieren toegediend worden. Enerzijds kan er gekozen worden voor een **orale inname via de mond**. Anderzijds bestaat er ook een **rectale toediening** via de darmuitgang (aars). Het voordeel van een rectale toediening is dat het product ter hoogte van de ontsteking kan inwerken. Hieronder wordt eerst de orale toediening verder toegelicht, daarna volgt een toelichting van de rectale toedieningsvorm.

azdelta
Uw ziekenhuis.

0520 5522-NL 05-03-2019

Orale inname via de mond

- Slik de tabletten in met een groot glas water. Bij voorkeur neemt u deze net voor de maaltijd in.
- Slik de tabletten en granulaten (zakjes met korreltjes) in **zonder** hierop te bijten.
- De tabletten mogen **niet** opgelost worden.
- De tabletten mogen wel gebroken worden als u problemen ervaart met het doorslikken ervan.
- Bij maagklachten kunnen de tabletten tijdens of net na de maaltijd genomen worden.
- Er bestaat mesalazine in tabletvorm of in zakjes/sachets

Rectale toediening via de darmuitgang (aars)

- Er wordt aangeraden om het product **'s avonds voor het slapen** gaan toe te dienen. Zo kan het geneesmiddel langere tijd ter plaatste blijven en beter inwerken.
- Een gedetailleerde beschrijving hoe u dit product moet gebruiken kunt u terugvinden op de bijsluiter van het geneesmiddel.
- Er bestaan ook verschillende rectale toedieningsvormen, zoals zetpil, foam of lavementjes

Te verwachten effecten

Vanaf de tweede tot vierde week van behandeling kan er al een effect waargenomen worden. Er is meestal een duidelijk effect merkbaar bij patiënten vanaf de twaalfde behandelingsweek.

Mogelijke bijwerkingen

Bijwerkingen van mesalazines zijn extreem zeldzaam.

- Hoofdpijn
- Diarree
- Misselijkheid
- Overgevoeligheidsreacties (bv.op longen, pancreas of hartzakje)

Verder zijn er nog een aantal zeldzame bijwerkingen beschreven. Dit is bij veel medicijnen het geval. Als u last krijgt van bijwerkingen neem dan zeker contact op met uw behandelende arts.

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Enkele bijzonderheden

- Orale en rectale therapie mogen bij de start van de behandeling gecombineerd worden.
- Bij orale toediening mag u dagelijks de verschillende tabletten of zakjes op één moment innemen.
- Bij obstipatie (verstopping) mag u niet stoppen met de behandeling! In eerste plaats uw voeding uitbreiden. Het is geen probleem om een zacht laxeermiddel te gebruiken.
- Niet gebruiken bij een bekende allergische reactie voor salicylaten.
- Mesalazine mag niet gebruikt worden bij ernstige nier- of leverziekte.
- Mesalazines kunnen het effect van azathioprine of 6-mercatopurine versterken.

Tijdsschema

Voorgeschreven geneesmiddel: .....

Voorgeschreven dosis: .....

	Datum	Lab	Opmerkingen
Voor start		**X**	
Na 2	Telefonisch contacteren van IBD-verpleegkundige		
Na 4 weken		**X**	Raadpleging bij arts
...			

Als u geen klachten meer hebt bestaat de verdere opvolging uit jaarlijks één raadpleging bij de arts.

Als u nog vragen hebt over het gebruik van mesalazine of andere medicatie die gebruikt wordt bij colitis ulcerosa, zijn we uiteraard bereid tot verdere inlichtingen. Neem gerust contact op. De contactgegevens vindt u vooraan in dit mapje.

Bron: IBD-verpleegkundige, 5 maart 2019