Medicatie IBD - Risankizumab (Skyrizi®)

Wat is Risankizumab?

Patiënten met een inflammatoire darmziekte hebben een verhoogde ontstekingsreactie in de darm. Die ontsteking wordt veroorzaakt door cytokines. Dat zijn eiwitten die onze witte bloedcellen aansturen om ontsteking te veroorzaken of te onderhouden. Risankizumab gaat specifiek 1 cytokine afremmen met name IL-23 en zo de ontstekingsreactie in de darm doen afnemen.

Voorbereiding opstart

Voor de behandeling start, controleren we of je geen actieve of chronische infecties doormaakt (zoals hepatitis, CMV, EBV ...). We controleren jou ook op (in)actieve tuberculose. Voor die controle kijken we naar je **persoonlijke voorgeschiedenis** en bespreken we eventueel vroeger contact met tuberculose. Daarnaast nemen we een **röntgenfoto (RX) van de longen** en plannen we een **tuberculinehuidtest** (prikje onder de huid) **of een bloedafname** (IGRA-test).

Er wordt voorafgaand aan de opstart van de behandeling een echo, labo en stoelgangtest (voor calprotectinebepaling) uitgevoerd. We plannen een darmonderzoek of NMR entero in als dat niet recent gebeurd is.

De behandeling met risankizumab omvat twee fases: een opstartfase en een onderhoudsfase.

azdelta

Deze brochure is laatst aangepast op 19/05/2026 0520 6402-NL

Opstartfase

De opstart gebeurt aan de hand van 3 infusen, die worden ingepland op week 0, week 4 en week 8.

Voor deze toedieningen moet er een dagopname gepland worden in het dagziekenhuis. Risankizumab dienen we dan via een infuus rechtstreeks in de ader toe. Dit is een vaste dosis van 600 mg die over 1 uur tijd inloopt.

Werkwijze voor de infusen

- Meld je aan bij de kiosk aan de ingang van het ziekenhuis. Hier ontvang je de identificatieklevers en route naar het dagziekenhuis.
- Volg de routebeschrijving naar het dagziekenhuis en meld je aan bij het secretariaat.
- Je krijgt een zetel toegewezen.
- Voor de toediening van ieder infuus controleren we de parameters (bloeddruk, pols, temperatuur).
- De verpleegkundigen nemen voorafgaand aan jouw infuus een standaard bloedafname en plaatsen het infuus.
- Daarna schakelen we de leidingen voor het infuus en de medicatie aan.
- Na het inlopen van de medicatie moet er nog 10 minuten worden gespoeld.
- Nadien mag je opnieuw naar huis.

Risankizumab wordt opgestart in het dagziekenhuis. Om een vlotte werking te garanderen vragen we om **minimum 2 uur voor het afgesproken tijdstip** te telefoneren naar onze ziekenhuisapotheek op het nummer 051 23 78 24. Geef daar jouw naam en geneesmiddel door zodat zij dit tijdig kunnen klaarmaken.

Ben je ziek, heb je koorts, of twijfel je of je de medicatie mag krijgen? Neem altijd eerst contact op met de IBD-verpleegkundige om na te gaan of de toediening kan doorgaan.

Evaluatie

Op 8 weken na de opstart volgt het eerste evaluatiemoment bij de arts. Graag hebben we de uitslag van een bloedtest en een stoelgangtest met calprotectine voorafgaand aan deze raadpleging. Er wordt ook een echo uitgevoerd. Indien de evaluatie positief is, gaan we verder naar de onderhoudsfase.
Eén jaar na opstart van de behandeling plannen we een nieuwe coloscopie of NMR entero.

Onderhoudsfase

Op week 12 wordt er gestart met een inspuiting van risankizumab 360 mg die om de 8 weken moet worden toegediend. De toediening van risankizumab gebeurt aan de hand van een On-Body-Injector (OBI).



De IBD-verpleegkundige legt jou uit hoe je de OBI precies moet gebruiken. We raden aan om deze eerste toediening op week 12 samen met de IBD-verpleegkundige te zetten. Nadien kan je de OBI zelfstandig thuis toedienen. Als je je na de eerste toediening onzeker voelt, dan kan je op het moment van de volgende toediening opnieuw een raadpleging met de IBD-verpleegkundige inplannen.

Jaarlijks moet er een terugbetaling worden aangevraagd bij jouw ziekenfonds. Hou de vervaldatum van het attest in de gaten zodat we dit op tijd kunnen vernieuwen.

Nuttige info

- Risankizumab is licht- en warmtegevoelig. Daarom moet je de verpakking gesloten bewaren in de **koelkast** (tussen 2 en 8 graden).
- Je haalt de OBI 45 min voor het toedienen uit de koelkast.
- Gebruikte OBI moet je in een **naaldcontainer** weggooien. Een volle naaldcontainer breng je naar het containerpark.
- Een nieuwe naaldcontainer kan je aankopen in de apotheek, thuiszorgwinkel of online.
- De medicatie blijft éénmalig tot 24 uur stabiel op kamertemperatuur (< 25 graden). Als je niet kan verzekeren dat de medicatie op kamertemperatuur blijft (bijvoorbeeld in een warme auto) dan vervoer je de medicatie best in een **koeltasje**.
- Bij vliegreizen kan je arts een 'reispasje' invullen. Hierop staat dat je medicatie mee mag nemen in de handbagage. Medicatie mag niet in de ingecheckte bagage, omdat de lage temperaturen in het bagageruim de medicatie kunnen destabiliseren en de werking aantasten.

Te verwachten effect

Na het tweede infuus kan je al een beginnend effect waarnemen. Na 8 weken moet er een duidelijk effect zijn vooraleer er wordt verder gegaan met de medicatie via de OBI.

Mogelijke bijwerkingen

- Licht verhoogde gevoeligheid voor infecties (zoals bovenste luchtweginfecties)
- Hoofdpijn
- Lokale huidreactie na de inspuiting
- Schimmelinfectie van de huid

Zwangerschap en borstvoeding

Ben je zwanger, denk je zwanger te zijn, wil je zwanger worden of geef je borstvoeding? Neem dan contact op met je arts of IBD-verpleegkundige.

Enkele bijzonderheden

- Voorafgaand aan de start van de behandeling raden we aan om vaccinaties tegen hepatitis B, tetanus en pneumokokken in orde te brengen.
- Een jaarlijks covid- en griepvaccin raden we sterk aan.
- Tijdens de behandeling met risankizumab mogen geen levende vaccins gegeven worden (bv. gele koorts of bof-mazelen-rubellavaccin).
- Als je rookt, adviseren we jou een rookstopbegeleiding

Medicatieschema



Tijdschema

	Datum	Planning
VOOR START		Gesprek met IBD-verpleegkundige Calprotectine, labo en echo Screening voor infecties en tuberculose: • Anamnese • Röntgenfoto van de longen • Tuberculinetest (mantoux) en bloedafname OF bloedafname met IGRA-test
WEEK 0		Toediening eerste infuus
WEEK 4		Toediening tweede infuus + raadpleging van IBD-verpleegkundige in het dagziekenhuis
WEEK 8		Raadpleging bij arts met voorafgaand calprotectinetest en labo, echo Toediening derde infuus Terugbetalingsattest voor het ziekenfonds
WEEK 12		Eerste toediening met OBI onder begeleiding van IBD- verpleegkundige
WEEK 20		Tweede toediening met OBI
Eerste jaar na start	maand 6 - 9 - 12	3-maandelijkse raadpleging bij arts telkens met het labo en om de 6 maanden calprotectinetest
Vanaf één jaar na opstart	om de 6 maand	Controleraadpleging met op voorhand labo en calprotectine

Als je nog vragen hebt over het gebruik van risankizumab of andere medicatie bij de ziekte van Crohn of bij colitis ulcerosa kan je ons gerust contacteren.

Contact

Tijdens het hele traject word je bijgestaan door de IBD-verpleegkundige. Bij vragen kan je steeds contact opnemen.

IBD-verpleegkundige
t 051 23 78 59
e ibdverpleegkundige@azdelta.be