

# Doelgerichte behandeling antilichaam-geneesmiddelconjugaat Mirvetuximab soravtansine (Elahere®)

Beste patiënt

Uw arts heeft u volgende behandeling voorgesteld. We geven u graag wat meer informatie. We wensen u veel succes en goede moed met uw behandeling.

De dienst oncologie

## Wat is Mirvetuximab soravtansine?

Mirvetuximab Soravtansine is een zogenaamde antibody-drug conjugate: een antilichaam gericht tegen een eiwit op kankercellen (folaatreceptor-alfa), gekoppeld aan een vorm van chemotherapie. Door die aanpak wordt de chemotherapie specifiek bij de kankercel afgeleverd, waardoor de bijwerkingen minder zullen zijn.

Mirvetuximab soravtansine is dus een **gerichte kankerbehandeling** (doelgerichte therapie) die wordt gebruikt bij sommige vormen van eierstokkanker (ovariumcarcinoom), eileiderkanker.

Het is bedoeld voor patiënten bij wie de tumor FR alfa-positief (folaatreceptor-alfa) is.

## Hoe werkt het?

Mirvetuximab soravtansine is een antilichaam-geneesmiddelconjugaat (ADC). Een celremmend geneesmiddel wordt rechtstreeks aan de kankercellen afgegeven. Het bestaat uit 2 belangrijke delen:



- **mirvetuximab** is een antilichaam dat zich specifiek de folaat receptor-op bepaalde kankercellen zal herkennen en zich hieraan zal binden.
- Eens het zich aan de cel bindt, komt het cytotoxische deel (soravtansine) vrij in de kanker cel. Soravtansine is een **celremmend** geneesmiddel om kankercellen te vernietigen of de groei van kankercellen af te remmen.

## Toediening

- De behandeling vindt plaats op het dagziekenhuis oncologie en gebeurt via **infuus** in een ader (intraveneus).
- Het eerste infuus loopt 60 tot 120 minuten, de snelheid wordt elk half uur opgedreven tot de maximumsnelheid. Als dit goed verloopt, kan vanaf de tweede cyclus het infuus aan de maximumsnelheid gegeven worden: dit infuus loopt dan 60 tot 90 minuten.
- U krijgt de behandeling **om de 3 weken** (één cyclus).
- Voor en tijdens de toediening kunnen medicijnen worden gegeven om bijwerkingen te verminderen (zoals anti-allergiemedicatie of corticosteroiden).

## Mogelijke bijwerkingen

Zoals bij elke behandeling kunnen er nevenwerkingen optreden. Niet iedereen krijgt hier last van, en de ernst kan verschillen.

### Vaak voorkomende bijwerkingen:

- Vermoeidheid
- Misselijkheid of braken
- Buikpijn of diarree
- Verminderde eetlust
- Droge ogen, wazig zicht of oogpijn
- Verhoogde leverwaarden in het bloed

## Minder vaak, maar belangrijk:

- Oogklachten (keratopathie): laat het zeker weten als u wazig zicht, lichtgevoeligheid of pijn ervaart. U krijgt mogelijk oogdruppels voorgeschreven om dit te voorkomen.
- Een overgevoeligheidsreactie tijdens het inlopen van het infuus: rillingen, koorts, kortademigheid, huiduitslag. Meld dit onmiddellijk.
- Lage bloedplaatjes (trombocytopenie) of lage rode bloedcellen (anemie).

## Adviezen tijdens de behandeling

- Gebruik steeds uw voorgeschreven oogdruppels volgens de instructies.
- Draag bij voorkeur een zonnebril om de ogen te beschermen tegen fel licht. Draag liever geen contactlenzen.
- Drink voldoende water.
- Breng uw arts op de hoogte bij koorts, ernstige vermoeidheid, bloedingen of plots gezichtsverlies.
- Vermijd nieuwe medicatie of supplementen zonder overleg met uw arts.

## Nabehandeling thuis en praktische info

Als uw waarden van uw bloedafname niet goed zijn of als uw nevenwerkingen te zwaar zijn kan uw arts beslissen de behandeling uit te stellen of definitief te stoppen.

Bij vragen of ongemakken kan u contact opnemen met het ziekenhuis, zie telefoonlijst in deze infomap.