

Naar huis met een ureterstent



azdelta

Uw ziekenhuis.

Beste patiënt

Er werd bij u een buisje (ureterstent) geplaatst in de urineleider tussen de nier en de blaas. Deze zal weer worden verwijderd op een tijdstip gekozen door uw arts. Hier geven we u al wat informatie mee. Hebt u nog vragen, aarzel niet om ze ons te stellen.

De artsen en medewerkers van de dienst urologie

Praktisch

Wij verwachten u terug opdag/...../..... om uur

Nuchter op de dagkliniek

Voor het verwijderen van de stent, zonder RX
Verwijderen stent voorafgegaan door een CT
voor een 2de ureteroscopie
Andere:

Op de raadpleging

Na CT
Andere:.....

Kunt u de afspraak niet nakomen, gelieve minstens de dag voordien te verwittigen voor:

- Campus Roeselare op het nummer 051 23 70 08,
- Campus Menen op het nummer 056 52 25 78
- Campus Torhout op het nummer 050 23 24 36

1

Wat is een ureterstent?

Een ureterstent is een buisje geplaatst in de urineleider tussen de nier en de blaas.
In het geval van een uretersteen (steen die vrijgekomen is uit

de nier en die zorgt voor blokkage van de urineafloop) wordt er dank zij dit buisje voor gezorgd dat de urine opnieuw kan aflopen en de pijn verdwijnt. Anderzijds zorgt dit buisje voor een uitzetting van de urineleider waardoor het steentje verder kan indalen en hopelijk uitgeplast kan worden. Ook wanneer men er in slaagde de steen met camera eruit te halen, wordt soms nog een buisje nagelaten om te verhinderen dat er door de zwelling nog een tijdelijke blokkage blijft bestaan. Uw uroloog zal u zeggen hoe lang de stent ter plaatse moet blijven. Er wordt een afspraak meegegeven om de stent te verwijderen.

2 Normale bijverschijnselen

Er zijn een aantal kenmerken eigen aan een ureterstent die als 'normaal' moeten worden beschouwd en u niet mogen verontrusten.

- Het uiteinde van het buisje in de blaas kan blaasprikkeling veroorzaken met neiging tot **frequenter plassen**
- Door wrijving tegen het blaasslijmvlies kan **bloedverlies** tijdens het plassen optreden.
- Tijdens het plassen kan er urine terugstromen naar de nier, waardoor een lichte stuwing of **druk in de flank** kan gevoeld worden, soms ook buikpijn. Een pijnstillertablet kan hierbij hulp bieden.
- **Drink dagelijks 1 liter tot 1.5 liter**, dit kan de kans tot infectie verkleinen en zal de hoeveelheid bloed in de urine doen afnemen.

3 Alarmsignalen

Neem contact op als u:

- koorts hebt hoger dan 38,5°C
- veel pijn hebt
- merkt dat bloed in de urine sterk toeneemt.

Contact

CAMPUS WILGENSTRAAT

Secretariaat dienst urologie

t 051 23 70 08

CAMPUS MENEN

Secretariaat dienst urologie

t 056 52 25 78

CAMPUS TORHOUT

Secretariaat dienst urologie

t 050 23 24 36

www.azdelta.be

Bron: info verpleegkundig specialist, 28 mei 2019

Artsen

Dr. Kristien Boel

Dr. Lieven Goeman

Prof. dr. Steven Joniau

Dr. Heleen Maes

Dr. Wouter Marchand

Dr. Hans Van der Eecken

Dr. Wim Van Haute

Dr. Jean-Louis Vanhoucke

Dr. Lieven Verhamme