

Niersteenverbrijze- laar ESWL



azdelta

Uw ziekenhuis.

Beste patiënt

Er werd bij u een planning gemaakt voor een uitwendige verbrijzeling van een steen in de nier of urineleider (Extracorporal Shock Wave Lithotripsy of ESWL). In deze brochure geven we u meer informatie hierover.

De artsen en medewerkers van de dienst urologie

Voor deze behandeling verwachten wij u opdag
...../...../.....omuur.

Aan de inschrijvingskiosk van het onthaal neemt u de voor u voorziene stickers mee. Daarna meldt u zich aan bij het secretariaat urologie op de gelijkvloerse verdieping.

Kunt u de afspraak niet nakomen, verwittig ons dan graag ten laatste de dag voordien op het nummer 051 23 70 08.

.

1

Wat?

De niersteenverbrijzelaar is een toestel dat in staat is schokgolven te produceren die toelaten nierstenen of een steen in de urineleider te fragmenteren in kleinere stukjes, zodat deze gemakkelijker spontaan uitgeplast kunnen worden. Deze behandeling kan afhankelijk van de resultaten ofwel éénmalig zijn ofwel bestaan uit verschillende sessies. De behandeling duurt ongeveer 45 minuten.



2

V o o r b e r e i d i n g

Pijnmedicatie

Om de schokgolven beter te kunnen verdragen en om krachtiger te kunnen verbrijzelen is het aangeraden een vorm van pijnmedicatie in te nemen kort voordien (Bv. juist voor u van thuis naar het ziekenhuis vertrekt).

We adviseren een medicament uit de NSAID-groep (niet steroïdale anti-inflammatoire medicijnen), tenzij er een tegenindicatie bestaat zoals bij maag- of darmlijden.

Voorbeelden hiervan zijn:

- Feldene Lyotab of Voltaren suppo of tablet
- Ander merknamen uit die groep zijn; Apranax, Brufen, Celebrex, Nurofen, Mobic, Diclofenac..

Bij tegenindicatie voor bovenstaande NSAID-medicatie kan gekozen worden voor paracetamol, best met codeïne erbij zoals bv. Dafalgan Codeïne

OPGEPAST! Medicatie met aspirine (acetylsalicylzuur) zijn echter **niet** toegestaan omdat die ook een bloedverdunnend effect kunnen hebben. Bv. Aspirine, Aspro, Dispril, Sedergine...

Bloedverduunners stoppen

AANDACHT! Alle bloedverduunners dienen tijdig te worden gestopt

- 2 dagen op voorhand stoppen: Eliquis, Xarelto, Pradaxa
- 1 week op voorhand stoppen: Aspirine, Asaflow, Plavix, Ticlid, Marcoumar, Marevan

Zo nodig kan in overleg met de uroloog of huisarts gekeken worden of tijdelijk vervangende spuitjes nodig zijn.

Nuchter zijn?

Weet dat u niet nuchter hoeft te zijn en dat u in staat bent de auto te besturen.

3

Nazorg

Na de behandeling kan het zijn dat u enige tijd gruis plast. Soms is het nodig om het gruis op te vangen door middel van een zeefje, om het te laten onderzoeken.

Om het resultaat van de behandeling te controleren laten wij u op afgesproken tijdstip terugkomen eventueel ook om bijkomende beelden te laten maken.

Het is mogelijk dat u enige ongemak ervaart. Dit ongemak kan omschreven worden als een doffe pijn. Daarnaast zijn echter nierkolieken nog mogelijk. Een pijnstillertje kan hierbij helpen mocht dat nodig zijn.

4

Risico's en neveneffecten

De urine kan tijdelijk nog wat verkleurd zijn (bloederig), dit gaat normaal snel over veel te drinken. Als de pijn toeneemt dan staakt u best het drinken tot de pijn weer verdwenen is.

5

Neem contact op bij

- koorts hoger dan 38,5°C al dan niet in combinatie met koude rillingen
- pijn die toeneemt niettegenstaande u pijnstillers heeft ingenomen
- bloed in de urine met klonters die leiden tot moeilijk plassen

Neem dan contact op met uw arts, telefoonnummers vindt u op de achterkant van deze brochure;

6

Kostprijs

Als u wenst te weten hoeveel de behandeling u ongeveer zal kosten kunt u contact opnemen met de dienst facturatie op het nummer 051 23 62 05 of mailen naar factuur@azdelta.be

Handwriting practice lines consisting of 20 horizontal dotted lines.

Contact

CAMPUS WILGENSTRAAT

t 051 23 70 08

CAMPUS MENEN

t 056 52 25 78

CAMPUS TORHOUT

t 050232436

AZ WEST VEURNE

t 058 33 31 11

www.azdelta.be

Bron: info dienst urologie

Artsen

AZ DELTA

Dr. Kristien Boel

Dr. Lieven Goeman

Dr. Heleen Maes

Dr. Wouter Marchand

Dr. Hans Van der Eecken

Dr. Wim Van Haute

Dr. Jean-Louis Vanhoucke

Dr. Lieven Verhamme

AZ WEST VEURNE

Dr. Marjan Lantsoght

Dr. Jacques Pacco

Dr. Hannes Van den Bossche