

Orserdu (Elacestrant)

Wat is Orserdu?

Borstkankercellen kunnen groeien onder invloed van het vrouwelijk hormoon oestrogeen. Oestrogeen circuleert in het bloed en kan door middel van antennes op de kankercel (receptoren) de kankercellen het signaal geven om te groeien.

Orserdu is een oestrogeen receptor antagonist. Dit betekent dat de antennes op de kankercel geblokkeerd worden zodat oestrogeen de kankercel geen signaal meer kan geven om te groeien en zo kankercellen kunnen afsterven.

Orserdu werkt het best bij kankercellen die een bepaalde afwijking hebben, namelijk een ESR1-mutatie. Bij ongeveer de helft van de patiënten met een hormoongevoelige borstkanker is een ESR1-mutatie aanwezig. Deze mutatie zorgt ervoor dat de kankercellen niet meer gevoelig zijn aan bepaalde antihormoonbehandelingen die u voordien al kreeg. Klinische studies tonen aan dat Orserdu in deze situatie wel werkzaam is bij een groot deel van de patiënten.

De aanwezigheid van een ESR1-mutatie in de kankercellen wordt getest met een liquid biopsy test door middel van een bloedafname. Het resultaat van de bloedafname is meestal na een 2-tal weken gekend.

Hoe wordt deze behandeling ingenomen?

Er bestaan tabletten van 345mg en 86mg. De startdosis is 1 tablet van 345mg per dag.

Bij nevenwerkingen zal de dosis verminderd worden. Uw arts zal dit samen met u bespreken.

- Neem de tablet iedere dag op ongeveer hetzelfde tijdstip en eet iets om misselijkheid tegen te gaan
- Deel of plet de tablet niet en knabbel er niet op. Neem de tablet altijd in zijn geheel in.

Indien u twijfelt of u de medicatie heeft ingenomen, neem dan geen dubbele dosis, maar wacht gewoon het volgende tijdstip voor inname af.

Wat mag ik niet eten of drinken?

- pompelmoes (incl. pompelmoessap of andere dranken met pompelmoes)
- bitterappelsien (pomerans, zure oranje appelsien, Sevilla appelsien)

Deze producten kunnen de nevenwerkingen doen toenemen.

Mogelijke nevenwerkingen

- **misselijkheid of verminderde eetlust:** gebruik Litan of Motilium (tot 6 tabletten per dag)
- **diarree:** neem Imodium (tot 6 tabletten per dag)
- **constipatie:** gebruik Movicol zakjes (tot 3x per dag)
- **vermoeidheid**
- **opvliegers:** spreek hierover met uw arts, er bestaat medicatie om deze klacht te verminderen
- **hoofdpijn:** 1g paracetamol Dafalgan, (max. 4 keer per dag)
- **pijn aan de gewrichten**
- **verhoogde waarde cholesterol en triglyceriden**
- **verhoogde leverwaarde**
- **verminderde nierwerking**
- **bloedarmoede**

Er zal op regelmatige tijdstippen bloed geprikt worden om deze waarden goed op te volgen.

Inname van andere medicatie

Raadpleeg steeds uw arts/huisarts als u een nieuwe medicatie moet innemen.

Aarzel niet om bij vragen of problemen contact op te nemen: zie contactgegevens