Combinatie behandeling Padcev-Enfortumab vedotine en Keytruda-pembrolizumab

Beste patiënt

Uw arts heeft u volgende behandeling voorgesteld. We geven u graag wat meer informatie. We wensen u veel succes en goede moed met uw behandeling.

De dienst oncologie

Wat zijn Padcev en Keytruda?

De combinatie van Padcev (enfortumab vedotin) en Keytruda (pembrolizumab) is een behandeling voor bepaalde patiënten met blaaskanker en kankers van de urinewegen (nierbekken, urineleider of urethra).

- **Padcev is een zogenaamde antibody-drug conjugate**: een antilichaam gericht tegen een eiwit op kankercellen (nectin-4), gekoppeld aan een vorm van chemotherapie. Door die aanpak wordt de chemotherapie specifiek bij de kankercel afgeleverd.

- **Immuuntherapie Keytruda** activeert en versterkt het eigen immuunsysteem en valt langs deze weg enkel de kankercellen aan. Bij deze behandeling komen ook nevenwerkingen voor, maar ze zijn verschillend van de nevenwerkingen bij chemotherapie of radiotherapie. Immuuntherapie richt zich op de activatie van het eigen immuunsysteem waardoor de behandeling de tumor via een indirecte weg aanvalt. Het stimuleert het immuunsysteem zodat dit op een krachtige wijze de kankercellen kan herkennen en vernietigen.

azdelta
Uw ziekenhuis.

Deze brochure is laatst aangepast op 29/10/2025 0520 6551-NL

Hoe verloopt de behandeling?

De behandeling vindt plaats in het dagziekenhuis oncologie. De beide producten krijgt u toegediend door middel van intraveneuze (IV) infusie in uw ader gedurende 30 minuten. Uw opname in het dagziekenhuis neemt een halve dag in beslag. U ontvangt uw behandeling gedurende perioden die cycli worden genoemd. Elke behandelingcyclus duurt 21 dagen. Uw arts beslist hoeveel kuren u nodig heeft

U ontvangt Padcev op dag 1 en 8.
U ontvangt Keytruda op dag 1.

Dag 1: Padcev en Keytruda in het dagziekenhuis

Dag 8: Padcev in het dagziekenhuis

Dag 15: rustweek

Dag 21: start nieuwe cyclus/kuur

Mogelijke bijwerkingen

Bijwerkingen als gevolg van immuuntherapie: soms activeert de behandeling het afweersysteem zodanig dat het niet alleen de kankercellen, maar ook eigen, gezonde cellen aanvalt. Dat kan zich ook uiten in klachten die onschuldig lijken, zoals jeuk, buikpijn en diarree. Het is erg belangrijk uw klachten tijdig te melden.

Belangrijkste immuungerelateerde (Keytruda) bijwerkingen:

• Problemen met uw **longen**, zoals ademhalingsproblemen of hoesten. Dit kunnen verschijnselen zijn van ontsteking van de longen.
• **Diarree** (waterige, dunne of zachte ontlasting) of symptomen van ontsteking van de darmen zoals buikpijn en slijm of bloed in de ontlasting.
• Ontsteking van de **lever**. Klachten of symptomen van hepatitis zijn bijvoorbeeld afwijkingen in leverfunctietesten (bloedafname), of de ogen of de huid die geel worden.
• Ontsteking of problemen met uw **nieren**. Klachten zijn bijvoorbeeld

afwijkingen in nierfunctietesten (bloedafname) of minder urine produceren.
• Problemen met uw **hormoonproducerende klieren** (waaronder de hypofyse, schildklier en de bijnieren). Klachten zijn bijvoorbeeld vermoeidheid, gewichtsverandering of hoofdpijn en verstoord gezichtsvermogen.
• **Diabetes** (suikerziekte). Symptomen hiervan zijn buitensporige dorst, toename van eetlust met gewichtsvermindering, vermoeidheid, sufheid.
• Ontsteking van de **huid** die uitslag en jeuk kan veroorzaken.

Belangrijkste bijwerkingen Padcev:

- **Hoge bloedsuikerspiegel** (hyperglykemie). U kunt tijdens de behandeling met Padcev een hoge bloedsuikerspiegel krijgen. Vertel het uw zorgverlener meteen als u symptomen heeft zoals frequent urineren, toegenomen dorst, wazig zien.
- **Huidreacties**. Uitslag en ernstige huidreacties kunnen optreden tijdens het gebruik van Padcev. Vertel het uw zorgverlener meteen als u huiduitslag of een huidreactie krijgt die steeds erger wordt.
- Tijdens het gebruik van Padcev kunt u **zenuwproblemen** krijgen die perifere neuropathie worden genoemd. Vertel het uw zorgverlener onmiddellijk als u gevoelloosheid of tintelingen in uw handen of voeten of spierzwakte krijgt.
- **Oogproblemen**. U kunt bepaalde oogproblemen krijgen tijdens het gebruik van Padcev. Vertel het uw zorgverlener meteen als u droge ogen of wazig zicht heeft. Preventief gebruik van kunsttranen is aangewezen.
- **Haarverlies**. Bij een aantal personen zien we aanzienlijk haarverlies.

Andere mogelijke bijwerkingen Padcev:

- te weinig rode bloedcellen (bloedarmoede)
- misselijkheid, diarree en braken
- vermoeidheid
- verminderde eetlust
- veranderde smaak
- droge ogen
- gewichtsverlies
- droge of jeukende huid
- huiduitslag, platte of rode, verhoogde bultjes op de huid

Nabehandeling thuis en praktische info

Als uw bloedwaarden niet goed zijn of als de nevenwerkingen te zwaar zijn, kan uw arts beslissen de behandeling uit te stellen of definitief te stoppen. Bij vragen of ongemakken kan u contact opnemen met het ziekenhuis. Raadpleeg hiervoor de telefoonlijst in uw infomapje