Partiële circumcisie

azdelta
Uw ziekenhuis.

Beste ouder

In overlegt met uw arts is beslist om bij uw zoon een partiële circumcisie of besnijdenis uit te voeren. Hier geven we u graag meer uitleg over de ingreep en de nazorg. Als u nog vragen hebt, neem dan gerust contact op met uw arts.

Het team kinderziekten

De ingreep

Een partiële circumcisie of besnijdenis is een chirurgische behandeling waarbij de voorhuid van de penis gedeeltelijk wordt weggenomen. De hechtingen die worden gebruikt, zijn zelfverteerbaar en moeten dus niet worden verwijderd. De ingreep gebeurt onder algemene verdoving en eventueel extra lokale verdoving zodat uw kind geen pijn voelt de eerste uren na het ontwaken. De eerste dagen na de operatie kan de penis wat gezwollen zijn en kan er wat blauwe verkleuring optreden. Eventueel kan er nog beperkt bloedverlies zijn.

Wondzorg

1. Zolang zwelling van de penis aanwezig is na de operatie, wordt de penis best naar boven op de onderbuik gekleefd (met steriel kompresje ertussen) om ontzwelling te bevorderen . Na het urineren vernieuwt u het kompres.
2. Gedurende een tweetal weken, 2x per dag ontsmetten met chlorhexidini, de voorhuid naar achter brengen en terra-cortril oogsuspensie aanbrengen ter hoogte van hechtingen gedurende een 5 tal dagen.
3. Afhankelijk van de ingreep dat bij uw kind werd uitgevoerd kan het zijn dat u de eerst volgende dag na de ingreep wordt gevraagd om langs te gaan bij de huisarts voor het toedienen van de eerste zorgen. Volg hierbij steeds het advies van uw behandelende uroloog.

Pijnstilling na de ingreep

Gedurende de eerste 48 uur na de operatie wordt bij pijn volgende medicatie best systematisch en op vaste tijdstippen toegediend: paracetamolpreparaat:
1 van volgende , maximum 4x per dag:

- Dafalgan® siroop of zetpil
- of Perdolan® siroop of zetpil
- of Dafalgan® instant poeder

Indien nodig kunt u het paracetamolpreparaat maximaal 3x/dag combineren met één van volgende pijnstillende/ ontstekingsremmende preparaten.

- Nurofen® siroop of zetpil
- of Malafene® siroop
- Of Perdophen® siroop

Volg hierbij steeds de richtlijnen zoals aangegeven in de bijsluiter.
Aspirinebevattende medicatie zoals Aspegic®, Aspirine®, Sedergine®, Afebryl®, Perdolan® compositum is af te raden na de operatie.

Praktisch

Hygiëne

Douchen is mogelijk. Na het douchen mag u de penis droogdeppen maar niet droogwrijven. Gedurende een tweetal weken mag uw kind geen zitbad nemen en niet zwemmen tot de hechtingen beginnen uit te vallen.

Voeding

De eerste dag na de operatie is lichte voeding aangeraden. Het is belangrijk om veel water te drinken.

Schoolverlet/kinderopvang

De dag na de operatie kan uw kind terug naar school of

kinderopvang.

Controle

Bij uw vertrek uit het ziekenhuis krijgt u een controleafspraak mee van uw behandelende arts. Bij problemen of vragen kunt u steeds uw huisarts of uroloog raadplegen.

Complicaties

Neem contact op met de dienst urologie of uw huisarts na de ingreep:

- bij meer dan 38,5°C koorts
- toenemende pijn of zwelling van de penis
- een nabloeding

Kostprijs

Alle kosten voor uw verblijf en verzorging, komen op de ziekenhuisfactuur. Hebt u vragen over de ziekenhuisfactuur, neem contact op met de medewerkers van de facturatiedienst op het nummer 051 23 39 89 of via factuur@azdelta.be.

Contact

Campus Rumbeke en Menen
Secretariaat urologie
t 051 23 70 08
Kinderdagziekenhuis Rumbeke
t 051 23 63 38
Dagziekenhuis Menen
t 056 52 21 74
Campus Torhout
Secretariaat urologie
t 050 232436
Dagziekenhuis Torhout
050 23 23 41

AZ Delta Deltalaan 1, 8800 Roeselare **t** 051 23 71 11 **e** info@azdelta.be **w** www.azdelta.be
0520 5328-NL **Deze brochure is laatst aangepast op 20/04/2020**