Plaatsen van ligaturen bij slokdarmspataders

azdelta
Uw ziekenhuis.

Beste patiënt

Binnenkort wordt bij u een onderzoek van slokdarm en maag, een gastroscopie, uitgevoerd met kans op het plaatsen van ligaturen.
Deze folder vertelt u meer over de voorbereiding, het verloop en de nazorg van deze ingreep. Hebt u nog meer vragen na het lezen van deze folder? Dan geven wij u graag nog meer uitleg.

We wensen u een spoedig herstel toe.

De artsen en medewerkers van de dienst endoscopie.

1 Wat?

Ligaturen op slokdarmspataders (slokdarmvarices) worden altijd geplaatst tijdens een gastroscopie.

Een gastroscopie is een onderzoek waarbij de binnenzijde van de slokdarm, de maag een een stukje van de dunne darm wordt onderzocht door middel van een gastroscoop. Een gastroscoop is een soepele buis (sonde) met een camera die een kleurenbeeld toont op een televisiescherm van de binnenzijde van de slokdarm, de maag en de dunne darm. Doorheen de gastroscoop kunnen andere instrumenten ingebracht worden.

Ligaturen zijn rubberen bandjes (elastiekjes) die over slokdarmspataders worden geplaatst.



2 Doel

Het plaatsen van de ligaturen in de slokdarm wordt toegepast bij patiënten met slokdarmspataders. Slokdarmspataders kunnen open barsten waardoor ze hevige bloedingen kunnen veroorzaken (bloed braken). Het plaatsen van ligaturen is dus nodig om een bloeding te voorkomen (preventief) of om op het ogenblik dat er een plotse bloeding ontstaat, deze bloeding te stoppen. Deze laatste situatie is een dringende situatie.

3 Voorbereiding

Voor een gastroscopie met plaatsen van ligaturen moet u **nuchter** zijn. Dit betekent dat je 6 uur voor de ingreep niets meer mag eten, drinken, roken of medicatie in mag nemen. Bij een actieve bloeding is dit niet van toepassing.

Het is belangrijk om voor het onderzoek te weten of u **bloedverdunnende medicatie** (tabletten of injecties) neemt. U bespreekt best op voorhand met de behandelende arts die de ingreep zal uitvoeren of deze medicatie al dan niet gestopt moet worden en hoe lang voor de ingreep.

4 Verloop ingreep

Een gastroscopie met het plaatsen van ligaturen wordt steeds uitgevoerd onder sedatie of algemene verdoving (anesthesie).

Bij het plaatsen van ligaturen gaat de arts met elastiekjes vooraan op de scoop de spataders ter hoogte van de slokdarm afbinden. Nadien drogen de spataders na enkele dagen op. De ingreep duurt ongeveer een half uur.



Na afloop van de behandeling gaat u eerst naar de ontwaakzaal

van de endoscopieafdeling.

De eerste uren na de behandeling kunt u last hebben van een opgeblazen gevoel, pijn in de buik en pijn ter hoogte van het borstbeen. Dit komt onder andere doordat er tijdens de behandeling lucht in de slokdarm, de maag en de darmen wordt geblazen.

5 Risico's en neveneffecten

Bij een gastroscopie met ligaturen kunnen de volgende complicaties optreden:

- **perforatie**
  Deze complicatie is zeer zeldzaam bij het plaatsen van ligaturen (1 op 100 patiënten). Een perforatie is een scheur of een gaatje in de wand van de slokdarm, de maag of de dunne darm. De meeste perforaties kunnen endoscopisch gesloten worden, bij een klein aantal gevallen moet een operatieve ingreep gebeuren. Soms is dan ook een langere opname in het ziekenhuis noodzakelijk.

- **aspiratie**
  Dit is een complicatie die kan voorkomen bij een plotse bloeding van slokdarmspatatders. Het is een ontsteking van de longen nadat braaksel of veel speeksel in de longen is gekomen doordat men zich verslikt tijdens of na het onderzoek. Daarom wordt de patiënt bij een acute slokdarmbloeding altijd algemeen verdoofd en geïntubeerd.

- **laattijdige bloeding**
  3 tot 4 dagen na het plaatsten van ligaturen kan het voorvallen dat er opnieuw een bloeding ontstaat.
  Bij zwarte stoelgang, rood bloedverlies anaal of bloedbraken moet u een arts contacteren.

6 Nazorg

Dieet

- Eerste uur: geen voeding , geen dranken
- Na 1 uur: enkel plat water
- Dag na de ingreep: beperk u tot vloeibare voeding zoals dranken zonder koolzuurgas, yoghurt, pudding, platte kaas, soep... In feite kunt u die dag alles eten zonder stukjes.
- 2e dag na de ingreep: zachte voeding, alle voorgaande voedingsmiddelen worden toegelaten alsook een boterham zonder korst met smeerbaar beleg. Als warme maaltijd kiest u best voor puree met zeer zacht gekookte groenten en zachte vis (aandachtig zijn voor graatjes!) of roerei.
- Vanaf dag 3: nadien wordt alles terug toegelaten maar let blijvend op met harde voedingsmiddelen zoals botjes en graten van vlees of vis, harde frieten, noten en zaden. Zorg dat u altijd goed kauwt.

Medicatie

- Het opnieuw opstarten van bloedverdunnende medicatie gebeurt in overleg met de behandelende arts en wordt u na het onderzoek meegedeeld door de arts of een verpleegkundige.
- Na de ingreep moet u een protonpompinhibitor (PPI) innemen (Pantomed®, Pantoprazole®, ...). Dit is medicatie in pilvorm die zorgt voor een verminderde aanmaak van maagzuur. Deze medicatie moet worden ingenomen omdat na het plaatsen van de rekker, de zweer zal invallen en zo een klein wondje nalaat op het slijmvlies van de slokdarm. Wanneer de maagzuuraanmaak geremd wordt, zal dit wondje sneller herstellen.

Controle

Na het plaatsen van de ligaturen krijgt u een controleafspraak bij uw maag-darm-leverarts.
Soms is er een controlegastroscopie nodig enkele weken

nadien. Aangezien dit verschilt van patiënt tot patiënt zal uw behandelende arts dit met u bespreken als dit van toepassing is bij u.

7 Kostprijs

- Bij een gastroscopie met ligaturen wordt steriel materiaal éénmalig gebruikt.
- Bij een keuze voor een éénpersoonskamer kunnen kamersupplementen en ereloonsupplementen worden aangerekend. Tenzij u op een éénpersoonskamer verblijft als gevolg van medische redenen of als er geen andere kamers meer beschikbaar waren.
- De artsen zijn geconventioneerd en gebruiken bijgevolg de tarieven die erkend zijn door het RIZIV. Een prijsindicatie kan worden opgevraagd via de dienst facturatie (051 23 70 54).
- De factuur wordt opgemaakt via het ziekenhuis, in samenspraak met uw verzekeraar (derdebetalersregeling). Pas enkele weken na deze ingreep zal u gevraagd worden om de factuur te betalen.

Contact

CAMPUS ROESELARE

Secretariaat endoscopie

t 051 23 72 03

Secretariaat maag-darm-leverziekten

t 051 23 72 15

e secretariaat.mdl@azdelta.be

CAMPUS MENEN

Secretariaat maag-darm-leverziekten Menen

t 056 52 22 43

e secretariaat.mdl@azdelta.be

CAMPUS TORHOUT

Secretariaat maag-darm-leverziekten Torhout

t 050 23 24 01

e secr.inwendige.torhout@azdelta.be

www.azdelta.be

Bron: dienst maag-darm-leverziekten

Artsen

Dr. Filip Baert
Dr. Lieselot Baert
Dr. Jochen Decaestecker
Dr. Filip De Pauw
Dr. Joost Deprez
Dr. Lobke Desomer
Dr. Charlotte De Vloo
Dr. Dominiek De Wulf
Dr. Jef Dewyspelaere
Dr. Luc Harlet
Dr. François Marolleau
Dr. Pieter Vandecandelaere

AZ Delta Deltalaan 1, 8800 Roeselare **t** 051 23 71 11 **e** info@azdelta.be **w** www.azdelta.be
0520 5904-NL **Deze brochure is laatst aangepast op 18/08/2020**