

Plexusanesthesie hand-, pols- en elleboogchirurgie



azdelta

Uw ziekenhuis.



Beste patiënt

Binnenkort komt u naar het ziekenhuis om een ingreep onder plexusanesthesie te ondergaan. In deze brochure proberen we u zo duidelijk mogelijk uit te leggen wat dit precies inhoudt.

De dienst orthopedie

Algemene informatie

Bij deze vorm van anesthesie wordt een gedeelte van het lichaam, zoals een hand, onderarm of elleboog, tijdelijk gevoelloos, beweegloos en pijnvrij gemaakt. De zenuwbundel (plexus brachialis) die naar de arm loopt, wordt verdoofd. Onder echogeleiding brengt de anesthesist een dunne naald in uw hals, borstkas of oksel. Via deze naald wordt een verdovingsmiddel rond de zenuw ingespoten. Zo nodig wordt de positie gecontroleerd met stimulatie. De zenuwen of zenuwbanen worden tijdelijk uitgeschakeld.

Het onderzoek voor de operatie

In overleg met uw chirurg maakt u een afspraak bij uw huisarts om uw patiëntenboekje in te vullen. Het onderzoek voor de operatie laat toe de risico's te evalueren die aan de ingreep verbonden zijn. Daarom overloopt u met uw huisarts onder andere uw medische voorgeschiedenis, welke medicatie u inneemt en welke allergieën u hebt.

Het patiëntenboekje brengt u mee de dag van de ingreep. De anesthesist zal het boekje dan met u overlopen. Als u vooraf een anesthesist wenst te spreken, kan dit tijdens de kantooruren op het nummer van het secretariaat anesthesie (zie contactgegevens achteraan).

Voordelen van plexusanesthesie

Geen algemene verdoving

Er is geen risico op misselijkheid en braken.
Na de operatie mag u onmiddellijk iets eten en drinken.

Sneller ontslag

Vanuit de operatiezaal mag u onmiddellijk naar uw kamer en aansluitend kunt u vlot terug naar huis vertrekken.

Comfortabel

Na de operatie blijft de pijnstilling nog een tijdje werken.

Mogelijke verwikkelingen

De moderne anesthesie is heel veilig en neemt alle nodige voorzorgsmaatregelen. Ondanks deze voorzorgsmaatregelen kunnen er toch nevenwerkingen of verwikkelingen optreden.

Pijn tijdens het inspuiten van verdovingsmiddelen

De verdovingsmiddelen kunnen pijn of een onaangenaam gevoel veroorzaken wanneer ze worden ingespoten.

Blauwe plekken

U kunt een blauwe plek krijgen op de plaats waar u een inspuiting kreeg of waar een infuus werd geplaatst. Beschadiging van een klein bloedvat veroorzaakt immers de blauwe plek.

Kracht- en/of gevoelsverlies

Bij een onverwacht langdurige kracht- en/of gevoelsvermindering neemt u het best contact op met de dienst anesthesie. Een zenuwbeschadiging door een naald of een bloeditstorting is meestal tijdelijk en geneest vanzelf.

Een plexusanesthetische wordt altijd voldoende geëvalueerd. Bij een onvoldoende werkzame plexusanesthetische kan altijd een alternatieve verdovingsvorm overwogen worden.

Praktisch verloop

Bij aankomst in de operatiezaal zal de verpleegkundige u begeleiden naar de zaal waar u de plexusverdoving krijgt. U krijgt een infuus en wordt verbonden met de monitoring. Indien nodig krijgt u een bijkomend kalmeringsmiddel. Vervolgens wordt de plexusverdoving toegediend. Zodra de verdoving goed ingewerkt is, wordt u naar de operatiezaal gebracht en vindt de operatie plaats.

Het verband

Het effect van de plexusverdoving kan 6 tot 12 uur duren. Het is heel belangrijk dat het verdoofde lichaamsdeel constant ondersteund blijft door een verband. Vermijd warmte, koude en druk op de arm. Door de ongevoeligheid kunt u zich anders ongemerkt verwonden. Correct gebruik van een draagdoek is aangewezen! (zie onderstaande handleiding).


Aandachtspunten

Dag van de operatie

- U moet nuchter zijn. (richtlijnen patiëntenmap)
- Zorg voor een chauffeur.
- Zorg voor gemakkelijke kledij.

Na de operatie

- Zorg voor een chauffeur. Rij niet zelf naar huis.
- Zorg voor een begeleider als u te voet of met het openbaar vervoer bent.
- Laat uw arm in het verband zolang deze verdoofd is.
- Neem de pijnstillers zoals voorgeschreven op het schema.



Handwritten notes on a page with horizontal dotted lines.

Contact

Secretariaat anesthesie

CAMPUS WILGENSTRAAT

t 051 23 70 39

CAMPUS BRUGSESTEENWEG

t 051 23 69 12

CAMPUS MENEN

t 056 52 21 11

www.azdelta.be

Bron: dienst orthopedie