

Doelgerichte therapie Sonidegib (Odomzo®)

Beste patiënt

Uw arts heeft u volgende behandeling voorgesteld. We geven u hier graag meer informatie.

We wensen u veel succes en goede moed met uw behandeling.

De dienst oncologie

Wat is Odomzo?

Odomzo® is een medicijn tegen kanker dat gebruikt wordt om volwassenen te behandelen tegen een type huidkanker dat uitgebreid basaalcelcarcinoom wordt genoemd.

Hoe werkt Odomzo®?

Odomzo® is een medicijn tegen kanker, dat een van de belangrijkste eiwitten die betrokken zijn bij de ontwikkeling van basaalcelcarcinoom onder controle houdt. Dit kan de groei van de kankercellen vertragen of stoppen, of de cellen doden. Als gevolg daarvan zou uw huidkanker kunnen verbeteren.

Hoe in te nemen?

De standaarddosis is 200 mg per dag in 1 inname (= 1 capsule Odomzo® 200 mg).

Uw arts kan een andere dosis voorschrijven. Volg steeds de instructies van uw arts.

- Neem de capsules in hun geheel in. Kauw dus niet op de capsules, plet ze niet of doe ze niet open. Slik ze door met een glas water.
- Neem de capsules op een lege maag; ten minste 1 uur vóór



of 2 uur na een maaltijd.

- Als u moet braken na het innemen. Neem dan géén nieuwe dosis in maar wacht tot de volgende geplande tijdstip en neem dan de gewone dosis in.
- Als je vergeet een capsule in te nemen, neem ze dan alsnog in, tenzij er meer dan 6 uur zijn verstreken. Neem in dat geval de volgende geplande dosis op het gebruikelijke tijdstip in.
- Vermijd tijdens de inname van sonidegib het eten of drinken van pomelmoes(sap) of preparaten op basis van sint-janskruid.

Bijwerkingen

Volgende bijwerkingen zijn mogelijk bij de inname van deze medicatie

- Smaak veranderingen
- Haaruitval
- Diarree of constipatie
- Misselijkheid en braken
- Verminderde eetlust en gewichtsverlies
- Spier- en gewrichtspijn
- Huiduitslag en jeuk
- Verstoring van het menstruatiepatroon
- Vermoeidheid

Aandachtspunten

- Door het gelijktijdig innemen van andere geneesmiddelen/voedingssupplementen of bepaalde voedingsmiddelen, kan de werking van één van de geneesmiddelen versterkt of verzwakt worden. Daarom is het belangrijk dat uw arts op de hoogte is van alle voedingssupplementen en geneesmiddelen die u neemt. Dit geldt ook voor de geneesmiddelen die u zonder voorschrift kan krijgen. Start bovendien geen nieuwe geneesmiddelen op zonder overleg met uw arts.
- Odomzo kan ernstige afwijkingen veroorzaken aan het ongeboren kind. Gebruik als koppel 2 methodes om een zwangerschap te vermijden (bijvoorbeeld de anticonceptiepil, gecombineerd met een condoom). Bespreek met uw arts of u nog een kinderwens hebt.
- Geef geen bloed tijdens en tot 20 maanden na de behandeling.