

Staphylococcus aureus behandeling vóór operatie



azdelta

Uw ziekenhuis.

Staphylococcus aureus

Staphylococcus aureus is een bacterie die aanwezig kan zijn in de neus, keel of op de huid zonder dat u hiervan iets merkt. Ongeveer 30% van de bevolking draagt deze bacterie bij zich. De bacterie veroorzaakt normaal geen ziekte; maar bij beschadiging van de huid of slijmvliezen kan mogelijk wel infectie ontstaan. Bij een operatie kan de bacterie via een wonde het lichaam binnendringen en zo een wondinfectie veroorzaken.

Verwijderen van de bacterie

U ondergaat binnenkort een ingreep waarvoor het aangewezen is om de bacterie te verwijderen (= "dekolonisatie"). Hiervoor dient u een behandeling te ondergaan met een ontsmettende zeep en antibioticaneuszalf.

Behandelingsschema



De behandeling bestaat uit het aanbrengen van een **neuszalf (Bactroban®)** in de neus **3 maal per dag gedurende 5 opeenvolgende dagen vóór de ingreep**. Op een wattenstaafje of wisser neemt u een hoeveelheid zalf ter grootte van een luciferkopje en brengt u dit hoog in de neustop links en rechts aan. Dit is immers de voorkeursplaats van de bacterie. Duw daarna zachtjes op de neus met een draaiende beweging om de zalf verder te verspreiden.

Tegelijkertijd wast u uw huid gedurende **5 opeenvolgende dagen vóór de ingreep en de ochtend van de ingreep** volledig met **chloorhexidinezeep (Hibiscrub®)**. Bevochtig het volledige lichaam. Was uw gezicht met de onverdunde zeep, in het bijzonder rond de neus. Vermijd contact met de ogen, oren of mond. Gebruik dagelijks een vers washandje.

Was grondig de oksels. Was ook de rest van de borst, rug, schouders en armen. Was grondig de liesstreek, navel en bilnaad. Was uw benen en voeten en zeker ook tussen de tenen. Spoel daarna alles grondig af en droog af met een verse handdoek.

Op dag 1 en dag 5 van de voorbereiding wast u ook uw haar mee.

Tijdens de decontaminatieperiode moeten de handdoeken, washandjes, bedlinnen, ondergoed en nachtkledij van de patiënt minstens op dag 1, dag 2 en dag 5 vervangen worden. Volg het schema zoals weergegeven.

	DAG 1	DAG 2	DAG 3	DAG 4	DAG 5	DAG 6 (=dag van de Ingreep)
Datum	__/__/__	__/__/__	__/__/__	__/__/__	__/__/__	__/__/__
 Hibiscrub®	X	x	x	x	X	x
	+ haarwassing				+ haarwassing	
 Bactroban®	3x 's morgens 's middags 's avonds	3x 's morgens 's middags 's avonds	3x 's morgens 's middags 's avonds	3x 's morgens 's middags 's avonds	3x 's morgens 's middags 's avonds	/

Mondhygiëne

Een goede mondhygiëne is eveneens belangrijk. Poets grondig de tanden in de periode voorafgaand aan een operatie (2 keer per dag). In het geval van een tandprothese dient deze naast het poetsen ontsmet te worden door onderdompeling in Iso-betadine mondwater (onverdund). Laat in de 5 dagen voor de operatie het gebit 1 keer per dag 20 minuten weken en spoel daarna af.

Kostprijs

Hibiscrub: € 6,23

Bactroban: € 9,6

Contact

Mocht u nog vragen hebben, kan u ook steeds contact opnemen met de behandelende arts of team ziekenhuishygiëne (tel. 051/23 75 10).