

Verwijderen van neuspoliepen



azdelta

Uw ziekenhuis.

Beste ouder

Uw kind gaat straks naar huis nadat de neuspoliepen werden verwijderd. Het is mogelijk dat uw kind na de ingreep nog enkele dagen keelpijn heeft. Deze folder geeft u informatie over de nazorg bij thuiskomst.

De dienst neus-keel-oorziekten

Geneesmiddelen

Gedurende de eerste 48 uren na de operatie wordt bij pijn volgende medicatie het best systematisch en op vaste tijdstippen toegediend:

Stap 1: paracetamol volgens gewicht: één van volgende; maximaal 4 keer per 24 uren.

- Dafalgan[®] siroop of zetpil
- of Perdolan[®] siroop of zetpil

Stap 2: ibuprofen volgens gewicht; maximaal 3 keer per dag bij voorkeur rond de maaltijd medicaties:

- Nurofen[®] siroop of zetpil
- of Ibuprofen[®] siroop
- of Brufen[®] siroop
- of Algidrin[®] siroop

Volg hierbij steeds de richtlijnen zoals aangegeven in de bijsluiter.

Aspirinebevattende medicatie, zoals Aspegic[®], Aspirine[®], Sedergine[®], Afebryl[®] en Perdolan compositum[®], is **af te raden** na de operatie.

Mogelijks worden er neusdruppels voorgeschreven die gebruikt moeten worden volgens de instructies van de NKO-arts.

Voeding

Tijdens de eerste 24 uur na de ingreep is het belangrijk dat uw kind veel en regelmatig drinkt. Door te drinken vermindert de pijn. Koude, niet-bruisende dranken, zoals koude melk of plat water met een ijsblokje, zullen het gemakkelijkste gaan. Uw kind mag eten wat hij of zij wil en kan.

Nabloeding

Nabloeding is het belangrijkste risico na het verwijderen van de neuspoliepen. Het is niet abnormaal dat uw kind een kleine hoeveelheid bloederig neusslijm heeft of eenmalig oud, donkerbruin bloed braakt. Als uw kind grote hoeveelheden bloed verliest langs de neus of de mond of als hij of zij vers, rood bloed braakt, moet u altijd onmiddellijk de spoedopname contacteren. Een nabloeding kan zich voordoen tot 2 weken na de ingreep.

† Spoed campus Rumbeke 051 23 77 08

† Spoed campus Menen 056 52 25 00

† Spoed campus Torhout 050 23 23 01

School / kinderopvang

Uw kind kan terug naar school of opvang als hij of zij geen pijnstilling meer nodig heeft en voldoende kan eten en drinken. Gemiddeld is dit na enkele dagen. Verhoogde waakzaamheid voor nabloeding is nodig tot 2 weken na de ingreep.

Sporten / activiteiten

Zware inspanningen en warmte kunnen een nabloeding uitlokken. Deze worden het best vermeden tot 2 weken na de ingreep.

Controleafspraak

1 week na de ingreep gaat uw kind best op controle bij de huisarts. Een controleafspraak bij de neus-keel-oorarts dient u al dan niet zelf te maken volgens de instructies van de arts.

Kostprijs

Alle kosten voor uw verblijf en verzorging, komen op de ziekenhuisfactuur. Hebt u vragen over de ziekenhuisfactuur, neem dan gerust contact op met de dienst facturatie 051 23 76 66 of via factuur@azdelta.be

Notities

Handwriting practice lines consisting of 20 horizontal dotted lines.

Handwriting practice lines consisting of 20 horizontal dotted lines.

Handwriting practice lines consisting of 20 horizontal dotted lines.

Contact

Secretariaat neus-keel-oorziekten

CAMPUS RUMBEKE

t 051 23 70 22

CAMPUS MENEN

t 056 52 24 75

CAMPUS REMBERT TORHOUT

t 050 23 24 51

Dagziekenhuis kinderziekten

CAMPUS RUMBEKE

t 051 23 63 38

CAMPUS MENEN

t 056 52 21 74

CAMPUS TORHOUT

t 050 23 23 41

www.azdelta.be

www.kinderafdeling.azdelta.be

Bron: info dienst kinderziekten