

Bijschildklier- scintigrafie



azdelta

Uw ziekenhuis.

Beste patiënt

In deze folder over bij schildklierscintigrafie of parathyroïdscan geven we u meer uitleg over wat we hiermee precies onderzoeken en hoe het onderzoek verloopt. U vindt hier meer informatie over wat we van u verwachten om het onderzoek zo goed mogelijk te laten verlopen. Het nemen van de bij schildklierscintigrafie is veilig en pijnloos. Zijn er nog bepaalde zaken onduidelijk, stel ons gerust al uw vragen. Wij geven u graag antwoord.

Met vragen i.v.m. de kostprijs van dit onderzoek kan u steeds terecht bij de dienst facturatie op 051 23 78 48.

Het team nucleaire geneeskunde

1

Doel van het onderzoek

Bij schildklieren zijn kleine klieren die tegen de schildklier aan liggen. Bij een bij schildklierscan maken we onderscheid tussen de schildklier en de bij schildklieren met behulp van twee verschillende lichtradioactieve stoffen. Dit onderzoek geeft info over het functioneren en de ligging van de deze klieren.

Belangrijk:

Bepaalde medicijnen of een recent onderzoek met contraststof, kunnen het resultaat van dit onderzoek beïnvloeden. Het is belangrijk dat u uw arts op de hoogte brengt van alle medicijnen die u gebruikt, zodat uw arts u kan vertellen welke medicijnen u tijdelijk niet mag innemen voor het onderzoek.

2

Verloop van het onderzoek

Voor dit onderzoek is geen speciale voorbereiding vereist. U hoeft niet nuchter te zijn voor het onderzoek.

Deel 1: een eerste kleine hoeveelheid radioactief gemerkte

stof wordt toegediend via een inspuiting in de arm. Deze stof brengt de schildklier in beeld.

Wachttijd: om voldoende opstapeling van de gemerkte stof te bekomen, is er een wachttijd van ongeveer 3 uur. In die tussentijd mag u de dienst nucleaire verlaten of kunt u terugkeren naar uw kamer indien u bent opgenomen in het ziekenhuis. U kunt het best afspreken met de verpleegkundige hoe en waar u die wachttijd kunt overbruggen en wanneer u zich opnieuw moet aanmelden.

Deel 2: op het afgesproken tijdstip gebeurt de effectieve bijschildklierscintigrafie. U ligt hiervoor op de cameratafel met het hoofd in een hoofdsteen. Via een vooraf geplaatst infuus, wordt tijdens de beeldopnames de 2de lichtradioactieve stof toegediend. Gedurende 60 minuten worden foto's genomen vanuit verschillende richtingen. Het is belangrijk om heel stil te blijven liggen.

3 Resultaat van het onderzoek

De arts-nuclearist beoordeelt de kwaliteit van het onderzoek, voor u de afdeling verlaat en maakt een verslag. Het verslag wordt doorgezonden naar de arts die u behandelt. Hij/ zij zal u het resultaat van het onderzoek meedelen en indien nodig de gepaste therapie starten. Uw foto's zijn digitaal beschikbaar op PACSonWEB via <http://rx.azdelta.be>. Om deze te bekijken vraagt u het best het referentienummer aan de verpleegkundige.

4 Veiligheid en straling

- Het is niet aan te raden om een bijschildklierscintigrafie uit te voeren tijdens de zwangerschap! Laat dus zeker vooraf weten aan de verpleegkundige als u zwanger bent of zou kunnen zijn.
- Verwittig ons zeker indien u borstvoeding geeft. Enkele maatregelen zijn belangrijk om bestraling bij de pasgeborene te beperken. Vooraf afkolven en de baby gedurende 24uur na het onderzoek niet aanleggen kan een oplossing zijn. De

verpleegkundige geeft u zeker bijkomende informatie.

- De gebruikte activiteit wordt steeds zo laag mogelijk gehouden zodat het risico op eventuele neveneffecten verwaarloosbaar is, en niet opweegt t.o.v. de diagnostische informatie die het onderzoek oplevert. De stof zendt slechts een korte tijd straling uit en is na één dag praktisch volledig uit het lichaam verdwenen. Daarom is het beter om de eerste 12 uur na het onderzoek langdurig nauw contact met baby's, jonge kinderen en zwangere vrouwen te vermijden. De gewone verzorging mag uiteraard wel.
- Als u incontinent zou zijn, of u een incontinent persoon verzorgt die een onderzoek op de nucleaire geneeskunde onderging, was en ontsmet dan gedurende 24 uur na het onderzoek goed de handen, zeker na de aanraking van incontinentiemateriaal. Ook wordt gebruikt incontinentiemateriaal het best apart geplaatst in een zone met weinig passage om vervolgens mee te geven met gewoon huisvuil.

Uw afspraak voor een bijschildklierscintigrafie op / /

- om uur voor de eerste injectie.
- om uur voor het onderzoek.

Contact

Dienst nucleaire geneeskunde

☎ 051 23 77 43

Artsen

Dr. Kristien Casier

Dr. Liesbet De Ceuninck

Dr. Nele Lips

Dr. Evelyn Vranken