

Adriamycine

De behandeling wordt wekelijks gegeven en dit drie weken na elkaar. De vierde week is telkens een rustweek zonder behandeling.

Deze behandeling bestaande uit een bloedafname, een raadpleging bij uw behandelende arts en de toediening van de medicatie, zal ongeveer een halve dag duren. Het is ook raadzaam dat u zich, zeker voor de eerste behandeling, laat begeleiden door een kennis.

Hierna krijgt u in volgorde een overzicht van de medicatie die u zal worden toegediend, met hun eventuele mogelijke nevenwerkingen. Alle medicatie wordt in afzonderlijke infuuszakjes klaargemaakt, en via een infuusleiding in een bloedvat ingebracht.

Medicatie misselijkheid

U krijgt voor de start van de chemotherapie in het dagziekenhuis een tablet Akynzeo en een capsule Dexamethasone tegen de misselijkheid. Akynzeo kan constipatie veroorzaken waarvoor u zo nodig Movicolsiroop of zakjes kan innemen.

Dexamethasone is cortisone; dit kan gedurende enkele dagen een gloeiing in het gelaat geven.

U mag thuis nog extra Litican innemen tot 6 tabletten per dag zolang de misselijkheid aanhoudt.

Adriamycine

Dit product, dat een rode kleur heeft, zal ongeveer over 15 minuten inlopen.

Omdat deze chemotherapie sterk prikkelend is voor de aders, is steeds een port-a-cath of poortcatheter noodzakelijk.

Deze behandeling wordt over het algemeen goed verdragen. Volgende nevenwerkingen kunnen mogelijks worden verwacht:

- **Rood gekleurde urine** door de kleurstof van het product, kort na de toediening.

- **Haaruitval.** Meestal treedt er een verdunning van het haar op naarmate de behandeling vordert. Er kan gebruik gemaakt worden van een ijskap ter preventie van haaruitval.
- **Verandering nagels.** De nagels kunnen brozer worden en iets van kleur veranderen. U kan preventief de nagels kort vijlen en een goede, vochtinbrengende crème of olie aanbrengen thv nagel en nagelriem. Vermijd het gebruik van nagellak.
- **Uitdrogen van huid en slijmvliezen.** Voor droge huid best een goede hydraterende bodylotion of badolie te gebruiken. Droge slijmvliezen kunnen zich manifesteren als prikkelende ogen of (bloederige) korstjes in de neus. Voor de ogen kunnen oogdruppeltjes onder de vorm van kunsttranen gebruikt worden. Voor de droogte ter hoogte van de neus kan met een oorstokje een klein beetje vaseline in de neusingang gebracht worden of kan een neuszalf voorgeschreven worden. Vaginale droogte kan optreden onder chemotherapie. Bespreek deze klachten altijd met uw arts of verpleegkundig consulent.
- **Daling van de witte bloedcellen:** dit kan soms gebeuren in de loop van de behandeling. Dit kan een reden zijn om de chemotherapie met 1 week uit te stellen tot herstel van de bloedwaarden. U kan hier zelf niets aan doen. Wel moeten we u aanraden op te letten voor mogelijke infecties. **Controleer daarom regelmatig uw koorts, en bij een temperatuur van 38° C of hoger moet u uw arts hiervan onmiddellijk verwittigen of naar de spoed komen.**
- **Mondslimvliesontsteking.** Deze nevenwerking kan soms voorkomen tijdens uw behandeling. Een heel goede mondhygiëne is zeker aan te raden (meermaals per dag de tanden poetsen, met zachte tandenborstel). Ook het gebruik van sterk irriterende spijzen zoals kruiden, mosterd... zijn beter te vermijden. Mocht u hiervan toch last hebben, dan moet u dit zeker melden aan de arts, die u een mondspoelmiddel zal voorschrijven.
- **Vermoeidheid.**

Contact

Nog vragen? Neem gerust contact op.
Zie contactinfo vooraan in uw mapje.

