

Halaven

De hierna volgende chemotherapiebehandeling wordt toegediend in het dagziekenhuis. Eén cyclus omvat 21 dagen. De eerste dosis chemotherapie wordt toegediend in het dagziekenhuis op dag 1, een tweede dosis wordt 1 week later (=dag 8) toegediend. Dan volgt 1 week rust zonder behandeling.

Deze behandeling bestaande uit een bloedafname, een raadpleging bij uw behandelende arts en de toediening van de medicatie, zal ongeveer een halve dag duren. Het is ook raadzaam dat u zich, zeker voor de eerste behandeling, laat begeleiden.

Hierna krijgt u in volgorde een overzicht van de medicatie die u zal worden toegediend, met hun eventuele mogelijke nevenwerkingen. Alle medicatie wordt in afzonderlijke infuuszakjes klaargemaakt, en via een infuusleiding in een bloedvat ingebracht.

Litican

Dit is een middel om eventuele misselijkheid en/of braken zoveel mogelijk te beperken. Dit product wordt met een klein spuitje rechtstreeks in de leiding van het infuus toegediend kort voor en kort na de chemotherapie.

Na het beëindigen van uw behandeling, zal u van de verpleegkundige een aantal van deze tabletten meekrijgen naar huis. De tabletten kan u volgens noodzaak innemen (tot 6 per dag) met een beetje water.

Deze medicatie vereist een attest voor terugbetaling voor de medisch adviseur van het ziekenfonds, dit zal via het ziekenhuis voor u worden geregeld.

Halaven

Na de Litican is Halaven het chemotherapie product dat u zal worden toegediend. Het product is opgelost in een infuus van 100 ml en loopt in over ongeveer 5 minuten.

Halaven veroorzaakt meestal weinig misselijkheid. Zo nodig kan u thuis Litican innemen tot 6/dag bij misselijkheid.



Mogelijke nevenwerkingen:

- **Haaruitval** bij ongeveer de helft van de patiënten.
- **Laag aantal witte bloedcellen** met een verhoogde kans op infecties. U kan hier zelf niets voor doen. Wel moeten we u aanraden op te letten voor mogelijke infecties en/of koorts. Een laag aantal witte bloedcellen met koorts/infectie, kan op zeer korte tijd zeer ernstige infecties veroorzaken. **Bij koorts en/of een infectie, moet u daarom steeds onmiddellijk uw arts te verwittigen en naar de spoed komen!!** Er wordt meestal bij de huisarts een tussentijdse bloedafname gepland in de rustweek (ongeveer 1 week na de laatste toediening).
- **Buikkrampen en diarree** kunnen eveneens voorkomen. U mag bij diarree steeds Imodium innemen (tot 6/dag). Als de diarree echter langer aanhoudt dan 24 uur of bij ernstige klachten, moet u onmiddellijk uw arts verwittigen. In sommige gevallen kan een opname noodzakelijk zijn om uitdroging door diarree te voorkomen.
- **Constipatie:** (moeilijke en harde stoelgang). Neem hiervoor tijdig een laxatief zoals Movicolsiroop of Forlaxzakjes.
- **Neuropathie:** soms kunnen zinderingen of tintelingen ontstaan in de vingertoppen/voetzolen. Meld deze klacht steeds aan uw behandelend arts.
- **Spier-en gewrichtspijn.** Spierzwakte.
- **Verandering van smaak.**
- **Afwijkingen in de leverwaarden** van het bloed.
- **Afwijkingen op elektrocardiogram** van het hart (QT-verlenging). Vele andere medicatie kunnen ook invloed hebben op het hart. Start daarom nooit nieuwe medicatie op eigen initiatief, bespreek dit steeds met uw huisarts en behandelend arts.
- **Vermoeidheid.**

Naspoelen

Nadat alle medicatie werd toegediend, zal de verpleegkundige nog een laatste infuuszakje met fysiologisch water aanhangen, met de bedoeling u alle medicatie uit de infuusleiding eveneens toe te dienen. Op die manier zal u de voorgeschreven dosis volledig gekregen hebben.

Contact

Nog vragen? Neem gerust contact op.
Zie onderstaande vooraan in uw mapje.