

Herceptin-Perjeta

Deze 2 producten worden tijdens uw behandeling gecombineerd met chemotherapie.

Herceptin en Perjeta zijn beide antistoffen die inwerken op het HER2/Neu eiwit. Dit eiwit doet kankercellen groeien. Blokkeren van dit eiwit zorgt ervoor dat de kankercellen afsterven. Het aantal toedieningen hangt af van een aantal factoren. Uw behandelend arts geeft u hierover de nodige uitleg.

Herceptin

Het product wordt toegediend om de drie weken door middel van een spuitje met een kleine prik in de dij. De inspuiting wordt over het algemeen goed verdragen.

Mogelijke nevenwerkingen

- **Misselijkheid en braken**
Is meestal erg mild.
- **Milde diarree of dunnere stoelgang**
In erge gevallen mag u Imodium innemen
- **Vermindering van de hartfunctie**
Komt zelden voor. Tijdens uw behandeling zal op regelmatige tijdstippen de werking van uw hart worden gecontroleerd.

Perjeta

Het product wordt toegediend in een infuus dat loopt over ongeveer 60 minuten. Bij de tweede toediening kan het product toegediend worden over 30-60 minuten.

Mogelijke nevenwerkingen

- **Vermindering van de hartfunctie**
zie Herceptin
- **Vermoeidheid**
- **Hoofdpijn**
- **Huiduitslag**
- **Haaruitval**
- **Misselijkheid/braken en veranderde smaak**
- **Diarree**
U mag hiervoor starten met Imodium tot maximaal 4 maal 2 tabletten. Als de diarree echter meer dan 24 uur aanhoudt of gepaard gaat met hevige buikpijn en/of koorts, dan moet u zich onmiddellijk naar het ziekenhuis komen. Meestal wordt diarree gezien bij de eerste behandelingen en verbeteren de klachten na een aantal weken.
- **Spier-en gewrichtspijn**

Naspoelen

Nadat alle medicatie werd toegediend, zal de verpleegkundige nog een laatste infuuszakje met fysiologisch water aanhangen, met de bedoeling u alle medicatie uit de infuusleiding toe te dienen. Op die manier zal u de voorgeschreven dosis volledig gekregen hebben.

Contact

Nog vragen? Neem gerust contact op.
Zie contactinfo vooraan in uw mapje.

