

Xeloda

Wat is Xeloda?

Xeloda is een chemotherapieproduct dat in tegenstelling met de meeste chemotherapiebehandelingen niet via de ader toegediend wordt maar wel via de mond in de vorm van tabletten.

Deze tabletten worden meestal dagelijks gedurende 2 weken voorgeschreven, met nadien een week rust. Soms kan het schema wat aangepast worden.

Dosis

De dosis die afhankelijk is van uw lengte en gewicht, moet verdeeld worden over 2 innames per dag met ongeveer 12 uur tussentijd.

De tabletten moeten met water ingenomen worden, binnen de 30 minuten na een maaltijd.

Er bestaan tabletten van 150 mg en 500 mg. Indien u een combinatie van beide dient in te nemen, dan mag u zich absoluut niet van dosis vergissen. Dit zou belangrijke gevolgen kunnen hebben.

Sla ook geen enkele dosis over. Dit zou immers nadelig kunnen zijn voor het effect op uw ziekte.

Als u per ongeluk een inname vergeten bent, probeer dan niet om de vergeten inname in te halen of te verdubbel zeker niet de volgende dosis, maar zet de behandeling voort zoals uw dokter u heeft voorgeschreven.

Waar haal ik de medicatie?

Deze medicatie wordt u meestal meegegeven door de verpleegkundige in het dagziekenhuis. In de andere gevallen zal u van uw arts een voorschrift meekrijgen om deze medicatie in de ziekenhuisapothek af te halen.



Deze medicatie vereist een attest voor terugbetaling voor de medisch adviseur van het ziekenfonds. Dit wordt meestal rechtstreeks via het ziekenhuis voor u geregeld. Zoniet, dan zal u van uw arts een attest meekrijgen dat u dan moet opsturen naar het ziekenfonds.

Wanneer kom ik naar de dagkliniek?

Meestal wordt u telkens kort voor de start van een volgende cyclus gezien in het dagziekenhuis, Dit betekent dus meestal na de 14 dagen inname van de medicatie. Op die dag gebeurt dan een bloedafname en volgt een raadpleging bij uw behandelend arts.

De arts zal aan de hand van uw bloeduitslagen en uw eventuele nevenwerkingen bepalen of uw volgende behandelingscyclus kan doorgaan. De arts kan ook beslissen om uw dosis aan te passen.

De arts zal uw dosis medicatie voor de volgende cyclus of een voorschrift meegeven. Daarna mag u weer naar huis, en moet u tussendoor niet meer terugkomen, tenzij bij problemen.

Het kan ook zijn dat in overleg met uw behandelend arts, de bloedafnames gebeuren via uw huisarts.

Behandelingsduur

De totale duur van uw behandeling zal afhankelijk zijn van hoe uw lichaam op deze behandeling reageert.

Op regelmatige tijdstippen, ongeveer om de 2 tot 3 maanden, zullen onderzoeken gebeuren, om te zien hoe uw ziekte evolueert.

Bij een verbetering of stabilisering zal de behandeling verdergaan. Bij een verslechtering zal de arts in samenspraak met u beslissen om de behandeling te stoppen.

De behandeling kan eventueel ook gestopt worden als de nevenwerkingen van het product te erg zijn.

Mogelijke nevenwerkingen

Een behandeling met Xeloda wordt door de meeste patiënten vrij goed verdragen. Toch kan het product verantwoordelijk zijn voor een aantal onaangename nevenwerkingen.

Hierna vindt u een overzicht van de voornaamste bijwerkingen:

- **Hand-voetsyndroom.** Dit is een nevenwerking die af en toe kan voorkomen tijdens uw behandeling met Xeloda. Wij verwijzen hiervoor naar de specifieke informatie brochure over dit syndroom.
- **Diarree.** Bij ongeveer 1 op 2 patiënten kan Xeloda de oorzaak zijn van wat lossere stoelgang. Indien toch diarree zou optreden, dan mag u gerust gebruik maken van Imodium. U meldt dit best aan uw behandelend arts bij uw volgende raadpleging. Bij ernstige of aanhoudende diarree, neemt u best zo snel mogelijk contact op met uw behandelend arts.
- **Misselijkheid en braken.** Deze nevenwerking komt niet zo vaak voor. Indien nodig, dan kan u hiervoor Motilium innemen. Als u zou braken kort na inname van de Xeloda, dan dient u de Xeloda niet opnieuw in te nemen, u kunt gerust wachten tot de volgende dosis.
- **Ontsteking van het mondslijmvlies.** Een goede mondhygiëne is zeker aan te raden. U doet dit door bijvoorbeeld meermaals per dag de tanden te poetsen met een zachte tandenborstel. Mocht u toch last krijgen van mondontsteking, dan meldt u dit best aan uw arts die u hiervoor dan een mondspoelmiddel kan voorschrijven.

Contact

Nog vragen? Neem gerust contact op.
Zie contactgegevens vooraan in uw mapje.