

Chemotherapie Herceptin-Xeloda-Tucatinib

Deze behandeling bestaat uit een combinatie van drie producten. U zal voor deze behandeling om de drie weken naar het dagziekenhuis moeten komen. Tijdens deze dagopname wordt u bevraagd naar de nevenwerkingen, gebeurt een bloedafname en wordt u gezien door uw behandelend arts.

- Herceptin : prikje in de dij toegediend in de dagkliniek om de drie weken
- Xeloda : chemotherapie in pilvorm, tabletten in te nemen na ontbijt en na avondeten gedurende 14 dagen gevolgd door 1 week rust
- Tucatinib : tabletten in te nemen na ontbijt en na avondeten, continu innemen zonder rustweek

Herceptin

Herceptin wordt door middel van een prikje in de dij om de drie weken toegediend via het dagziekenhuis.

Herceptin is geen chemotherapie. Het product werkt in op een speciaal eiwit dat op de tumorcellen zit. Dit eiwit is in te grote hoeveelheid aanwezig op de kwaadaardige cellen en doet de cellen groeien. Herceptin blokkeert dit eiwit en neemt de groei stimulus van de kwaadaardige cellen weg.

Mogelijke nevenwerkingen

- **Algemeen onwel voelen**
Zweten, bloeddruk veranderingen (zelden). Als u ongemakken ondervindt tijdens de toediening, verwittig de verpleegkundige in het dagziekenhuis onmiddellijk.
- **Milde diarree of dunnere stoelgang**
Komt bij 1 op 4 patiënten voor. In erge gevallen mag u gebruik maken van Imodium.
- **Vermindering van de hartfunctie**
Kan in zeldzame gevallen voorkomen. Een echografie van het hart kan dan worden gepland.



Xeloda

Xeloda is een chemotherapie product dat in tegenstelling met de meeste chemotherapie behandelingen niet via de ader toegediend wordt, maar wel via de mond in de vorm van tabletten.

Deze tabletten worden **dagelijks gedurende 2 weken** voorgeschreven met **nadien een week rust**. Soms kan het schema wat aangepast worden.

De dosis is afhankelijk van uw lengte en gewicht. U zal een aantal tabletten 's ochtends en een aantal tabletten 's avonds moeten innemen.

U dient de tabletten met glas water **binnen de 30 minuten na het ontbijt en binnen de 30 minuten na het avondeten** in te nemen.

Er bestaan tabletten van **150 mg en 500 mg**. Let er steeds goed op dat u de juiste dosis inneemt.

Twijfelt u of u de tabletten al dan niet ingenomen hebt : neem geen dubbele dosis, wacht gewoon tot de volgende inname.

Bij ontstaan van nevenwerkingen kan uw arts de dosis aanpassen.

Bewaar deze tabletten op kamertemperatuur en ver buiten het bereik van kinderen.

U krijgt de tabletten mee in het dagziekenhuis.

Mogelijke nevenwerkingen

- **Hand-voetsyndroom**

Dit is een nevenwerking die af en toe kan voorkomen tijdens uw behandeling met Xeloda. Wij verwijzen hiervoor naar de specifieke informatie brochure over dit syndroom.

- **Diarree**

Bij ongeveer 1 op 2 patiënten kan Xeloda de oorzaak zijn van wat lossere stoelgang. Als er toch diarree zou optreden, dan mag u gerust gebruik maken van Imodium. U meldt dit best aan uw arts bij uw volgende raadpleging. Bij ernstige of aanhoudende diarree, neemt u best zo snel mogelijk contact op met uw arts.

- **Misselijkheid en braken**

Deze nevenwerking komt niet zo vaak voor. Indien nodig, dan kan u hiervoor Litan innemen. Als u zou braken kort na inname van de Xeloda, dan moet u de Xeloda niet opnieuw innemen, u kunt gerust wachten tot de volgende dosis.

- **Ontsteking mondslijmvlies**

Af en toe kan er een ontsteking van het mondslijmvlies voorkomen. Een goede mondhygiëne is zeker aan te raden. U doet dit door bijvoorbeeld meermaals per dag de tanden te poetsen met een zachte tandenborstel. Mocht u toch last krijgen van mondontsteking, dan meldt u dit best aan uw arts die u hiervoor een mondspoelmiddel kan voorschrijven.

Bij problemen tijdens uw behandeling of wanneer u zich zorgen maakt over de ernst van uw nevenwerkingen, aarzel dan niet uw behandelende arts te contacteren. U moet hiervoor dus niet wachten tot de volgende raadpleging.

Innameschema Xeloda

U neemt het voorgeschreven aantal tabletten in van de **1^o tot en met de 14^o dag** van elke cyclus. Daarna onderbreekt u de behandeling gedurende 1 week.

Dosis 's ochtends na ontbijt:

- tabletten van 150 mg
- tabletten van 500 mg

Dosis 's avonds na avondeten:

- tabletten van 150 mg
- tabletten van 500 mg

Tucatinib

Tucatinib is, net zoals Herceptin, een product dat inwerkt op het Her2/Neu-eiwit aanwezig op de kankercellen en ervoor zorgt dat de kankercellen afsterven.

Tucatinib is een behandeling in pilvorm. Er bestaan tabletten van **50 mg en 150 mg**. U zal dagelijks eenzelfde aantal tabletten moeten innemen. De eerste dosis moet u 's ochtends innemen na het ontbijt. De tweede dosis 's avonds na het avondeten.

U mag Tucatinib op hetzelfde moment innemen als de Xelodatabletten. Tucatinib dient **dagelijks** te worden ingenomen (dus geen rustweek zoals bij Xeloda).

Bij ontstaan van nevenwerkingen kan de dosis door uw arts steeds worden aangepast.

Mogelijke nevenwerkingen

- **Diarree**

Kan soms ernstige diarree zijn. Bij diarree mag u Imodium tot 6 tabletten per dag innemen en zorg ervoor dat u voldoende drinkt. Bij uitgesproken diarree : stop de pillen en neem zo snel mogelijk contact op met uw arts.

- **Misselijkheid**

Meestal mild. Bij misselijkheid mag u Litican innemen tot 6 tabletten per dag.

- **Aftjes in de mond**

Meestal mild. Zo nodig kan hiervoor een mondspoelmiddel voorgeschreven worden.

- **Hand-voetsyndroom**

zie aparte folder

- **Verminderde leverwerking**

Deze behandeling kan een verslechtering geven van de leverwaarden in het bloed. Er wordt bij iedere dagopname bloed geprikt en zo nodig wordt de dosis van de behandeling aangepast.

- **Huiduitslag**

Meestal mild

- **Vermoeidheid**

Innameschema Tucatinib

Dosis 's ochtends na ontbijt:

..... tabletten van 150 mg

..... tabletten van 50 mg

Dosis 's avonds na avondeten:

..... tabletten van 150 mg

..... tabletten van 50 mg

Aarzel niet om bij vragen of problemen contact op te nemen met uw arts, de borstverpleegkundige of de verpleegkundigen van het dagziekenhuis.