

Borstvlies- longvliespunctie (pleurapunctie)



azdelta

Uw ziekenhuis.

Beste patiënt

U hebt een afspraak voor een pleurapunctie. Dat is een onderzoek waarbij geprikt wordt tussen de ribben, naar de ruimte die zich bevindt tussen de ribben en de longen. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een arts en wordt verricht:

- om na te gaan of er vocht tussen de longvliesen zit en van welke aard het is.
- en/of om vocht tussen de longvliesen af te zuigen. Te veel vocht tussen de longvliesen kan de long in verdrukking brengen waardoor kortademigheid, benauwdheid optreedt.

De punctie wordt meestal uitgevoerd op de kamer of in het echolokaal. In deze brochure geven we u meer informatie mee.

De diensten oncologie en longziekten

Vorbereiding

Als u bloedverdunnende middelen of aspirines neemt, moet u dit vooraf melden aan de arts.

U wordt gevraagd de bovenkledij uit te trekken of omhoog te doen. Vervolgens mag u op de rand van het bed gaan zitten, de voeten ondersteund door een stoel of een kruk.

Het onderzoek

Eerst wordt de huid ontsmet. Dan krijgt u een prik waardoor de prikplaats verdoofd wordt. De verdoving kan een branderig gevoel geven.

Het onderzoek is door de verdoving in principe pijnloos. Er kan wel een hoestprikkel ontstaan.

Zodra de verdoving goed zijn werk doet, brengt de arts de punctienaald tussen ribben in, tot de holte tussen de twee longvliesen.

- Zodra het pleuravocht uit de punctienaald stroomt, wordt

het opvangen in een laboratoriumbuisje. Bij voldoende vocht wordt de naald verwijderd. Vervolgens wordt het vocht voor onderzoek opgestuurd naar het laboratorium.

- Aan de punctienaald kan ook een afvoersysteem bevestigd worden. Hierdoor loopt het vocht af. Als er geen vocht meer komt, wordt de naald verwijderd. De insteekplaats wordt afgedekt met een pleister.

Na het onderzoek

Na het onderzoek doet u het best nog een half uur tot een uur rustig aan. Bedrust hoeft niet. De verpleegkundige gaat na of de prikplaats niet bloedt of lekt. De pleister kan thuis verwijderd worden.

Na het onderzoek kunt u weer normaal autorijden, douchen en werken.

Mogelijke complicaties

Bij elke ingreep kunnen complicaties optreden. Zo bestaat er een kleine kans op lekkage van de prikplaats, een bloeding of een klaplong wat leidt tot plotse kortademigheid. Als er een complicatie optreedt, neem contact op met uw arts.

Resultaat van de ingreep

Het resultaat van het onderzoek in het lab is meestal na een aantal dagen bekend.

Contact

Oncologie

secretariaat

t 051 23 73 33

Longziekten

secretariaat campus Wilgenstraat

t 051 23 72 16

secretariaat campus Menen

t 056 52 22 43

www.azdelta.be

Bron: info dienst oncologie en longziekten, datum