

Accords concernant l'hémodialyse

Chère patiente, Cher patient,

En raison de l'organisation complexe et de facteurs médico-techniques, nous demandons de tenir compte des accords suivants. Nous vous remercions de votre compréhension.

Les médecins et collaborateurs du service de dialyse

Quand devez-vous vous rendre à l'hôpital d'urgence?

1. Potassium trop élevé

Si votre potassium devient trop élevé, vos muscles seront paralysés. D'abord les muscles des membres, puis le muscle cardiaque. Cela signifie une mort subite.

Si vous sentez que vos membres sont lourds, si la force disparaît de vos membres, si vous ne pouvez plus vous tenir debout correctement, si vous êtes moins capable de soulever quelque chose, alors **vous devez venir à l'hôpital d'urgence**. Dimanche, jour de la semaine, jour ou nuit, peu importe. Après tout, votre vie est en danger. Il faut vous amener et ne pas conduire vous-même !

La raison pour laquelle votre potassium devient trop élevé est une consommation excessive de produits comestibles riches en potassium. Les principaux sont: les légumes, les fruits - et certainement les fruits exotiques -, les jus de fruits, le chocolat, les chips, les crustacés, les noix, toutes les préparations dans lesquelles les légumes sont transformés comme la soupe et le ragoût !! Les saisons avec des fraises fraîches, des haricots nouveaux et des pommes de terre nouvelles sont particulièrement dangereuses. Il est facile de manger trop de ce qui a bon goût. Cela devient particulièrement dangereux le week-end lorsque le temps entre 2 séances de dialyse est le plus long. Ensuite, le potassium peut s'accumuler dans votre corps pendant 3 jours au lieu de 2 jours. Soyez donc prudent dans toutes ces circonstances.

2. Trop de liquide consommé

Boire trop signifie trop de prise de poids et comme vous n'arrosez plus les liquides ingérés, ou pratiquement plus de les arroser, ce liquide reste dans votre corps. **Si vous êtes essoufflé** en raison d'une prise de poids excessive entre 2 dialyses, cela signifie qu'il y a de l'eau dans vos poumons. **Cela doit être supprimé dès que possible**. Sinon, vous vous « noierez » dans votre propre eau. Cette complication survient également le plus souvent vers la fin du week-end. Lorsque vous avez très soif, il vaut mieux faire fondre un glaçon dans la bouche que de boire de grandes quantités de liquides !

3. Fièvre

Pour être sous dialyse, une route d'accès est nécessaire. C'est votre bouée de sauvetage et, en plus des médicaments et de l'alimentation, c'est vital pour votre traitement. Même une bonne hygiène et un travail stérile ne peuvent pas éviter tous les problèmes. Un certain nombre de symptômes importants peuvent indiquer que quelque chose ne va pas. La plupart des symptômes peuvent être remarqués par vous-même.

La rougeur, la douleur, l'enflure et la fièvre sont des situations alarmantes. Dans ce cas, vous devez immédiatement vous rendre à l'hôpital où un traitement approprié et efficace sera mis en place pour vous sauver, vous et votre bouée de sauvetage.

L'entrée du cathéter reste toujours enveloppée dans un pansement spécial; un bandage enveloppe. Cela ne devrait JAMAIS être ouvert !!

Accords concernant l'hémodialyse

1 Ordre de branchement

L'ordre de branchement n'est pas seulement déterminé par l'heure d'arrivée, mais aussi par d'autres facteurs tels que la durée de la dialyse, les examens à réaliser avant ou après la dialyse, le besoin en médicaments pour la dialyse, etc. D'où l'importance de respecter l'ordre de branchement indiqué par l'infirmier/ère pour ne pas compromettre le bon fonctionnement de la dialyse.

Bien que nous nous efforcions systématiquement de traiter autant que possible les patients dans la même unité de dialyse et dans le même shift de dialyse, cela peut ne pas être possible pour des raisons organisationnelles.

2 Pesée - vêtements pour la dialyse

Lors de chaque dialyse, on détermine le poids à l'arrivée et au départ. Il est préférable de toujours venir avec plus ou moins les mêmes vêtements/chaussures afin que nous puissions mieux contrôler le poids.

Si un cathéter de dialyse est présent, portez de préférence des vêtements pouvant s'ouvrir suffisamment à l'avant.




Si vous disposez d'une fistule, évitez les vêtements moulants autour du bras. Nous pourrions alors retrousser les manches pour implanter la fistule pour la dialyse.

3 Visite

Nous demandons de ne pas recevoir de visite dans le service de dialyse. Les exceptions peuvent être abordées avec le personnel infirmier.

4 Attente



Pour un déroulement optimal de l'organisation et du transport des lits et fauteuils roulants, nous vous demandons de patienter dans la salle d'attente jusqu'à ce qu'un collaborateur de dialyse vienne vous chercher.

5 GSM



L'utilisation du GSM en dialyse est autorisée.

6 Ordinateur portable et tablette



L'utilisation d'un ordinateur portable et d'une tablette est certainement autorisée pendant la dialyse. Pour accéder au réseau de l'hôpital, une connexion Wi-Fi peut être demandée. Mieux vaut en parler à l'infirmier/ère en dialyse, qui veillera alors à une connexion Wi-Fi pour vous.

7 Couvertures

Il n'est pas permis d'apporter des couvertures, des coussins, etc. à la dialyse.

8 Tablette

Pendant la dialyse, vous pouvez utiliser une tablette pour regarder la télévision ou écouter la radio. Il est plus facile d'apporter des écouteurs ou un casque à la dialyse.

9 Masque

Il est demandé aux patients équipés d'un cathéter de dialyse de toujours porter un masque lors du branchement de la dialyse et lors des soins d'habillage du cathéter de dialyse.