

Infomapje oncologie: chemotherapie Carboplatine (Paraplatin®)-Gemcitabine (Gemzar®)

Toediening

De gecombineerde chemotherapiebehandeling met Carboplatinum en Gemcitabine krijgt u u om de 3 weken toegediend. Op de eerste dag van de behandeling krijgt u de 2 producten toegediend. Op de 8° dag (dus 1 week later) enkel Gemcitabine. Nadien volgt er 1 week rust. Dit schema wordt soms individueel aangepast.

Het aantal dergelijke cycli is afhankelijk van hoe uw ziekte op deze medicatie reageert.

Dag 1: Carboplatinum-Gemcitabine

Dag 8: Gemcitabine

Dag 15: bloedafname door de huisarts, geen chemo

Dag 21 = dag 1: start volgende cyclus

Hierna krijgt u in volgorde een overzicht van de medicatie die u toegediend krijgt, met hun eventuele mogelijke nevenwerkingen. Alle medicatie wordt in afzonderlijke infuuszakjes klaargemaakt en via een infuusleiding in een bloedvat ingebracht.

Gemcitabine

U krijgt dit chemotherapieproduct op dag 1 van uw behandeling toegediend in combinatie met Carboplatinum. Op de 8° dag van de cyclus krijgt u dit product alleen toegediend.

Het product is kleurloos en het infuuszakje van 250 ml. waarin het product is opgelost loopt in op ongeveer 30 minuten



Gemcitabine wordt door de meeste patiënten vrij goed verdragen. Naast de klassieke nevenwerkingen zoals **moehed, verminderde eetlust, en een daling van uw aantal witte bloedcellen**, kan dit product verantwoordelijk zijn voor een aantal andere ongemakken nl.

- misselijkheid en/of braken na uw behandeling,
Dit kan voorkomen. Zoals reeds eerder beschreven kan u zich behelpen met het antibraakmiddel Litan.
- een laag aantal witte bloedcellen
U kunt hier zelf niets voor doen. Wel moeten we u aanraden op te letten voor mogelijke infecties. Controleer daarom dagelijks uw koorts, en bij een temperatuur van 38° C of hoger, moet u de arts hiervan op de hoogte brengen. Ook bij een infectie (met of zonder koorts!) zoals een verkoudheid, blaasontsteking... moet u zo snel mogelijk uw arts raadplegen. In de derde week - de therapievrije week - laat u bloed prikken bij de huisarts om de weerslag van de behandeling op de bloedwaarden na te gaan.
- daling bloedplaatjes
Ook uw bloedplaatjes, die instaan voor uw bloedstolling (bv. stelpen van bloeding uit een wonde...) kunnen gaan dalen. Bij verhoogde bloedingsneiging (bv. moeilijk te stelpen bloedneus, bloedend tandvlees...) raadpleegt u steeds zo snel mogelijk uw arts om een bloedafname te plannen.
- allergische huidreacties
Bij 1 op de 4 patiënten treden allergische huidreacties op tijdens of na de toediening van Gemcitabine. Het gaat om huiduitslag, al of niet gepaard gaande met jeuk. Deze nevenwerking verdwijnt meestal spontaan.
- symptomen zoals lichte koorts, hoofdpijn, rillingen en spierpijn
Deze symptomen, alsof u een beginnende griep doormaakt, komen bij 1 op de 5 patiënten voor, die met Gemcitabine behandeld worden. Mochten deze symptomen bij u optreden, dan mag u gerust Dafalgan gebruiken. U meldt dit best bij een volgende raadpleging bij uw arts.

- vochtophopingen
Bij ongeveer 1 op de 3 patiënten treden lichte vormen van vochtophopingen (oedeem) op ter hoogte van de handen, voeten en/of aangezicht. Deze klachten moeten doorgaans niet behandeld worden en verdwijnen spontaan na het stoppen van uw behandeling.
- lichte haaruitval
Dit kan ook optreden maar is eerder zeldzaam.
- slaperigheid
Dit kan bij de behandeling met Gemcitabine ook optreden als bijwerking. Wij raden u dan ook aan hiermee rekening te houden wanneer u zelf uw wagen wilt besturen.

Carboplatinum

Carboplatinum krijgt u enkel op dag 1 van elke cyclus van uw behandeling. Carboplatinum is een kleurloos product dat in een infuuszakje van 500 ml opgelost werd. De toediening neemt 60 minuten in beslag. Naast de klassieke nevenwerkingen zoals moeheid, eventueel misselijkheid en braken of verminderde eetlust, kan dit product verantwoordelijk zijn voor een aantal andere ongemakken nl.

- een laag aantal witte bloedcellen
U kunt hier zelf niets voor doen. Wel moeten we u aanraden op te letten voor mogelijke infecties. Controleer daarom dagelijks uw koorts, en bij een temperatuur van 38° C of hoger, moet u de arts hiervan op de hoogte brengen.
- een stoornis optreden in de nierfunctie
U kunt hier zelf ook niets voor doen, maar uw arts zal vóór elke nieuwe behandeling uw bloedwaarden hierop controleren. Neem thuis geen medicatie in die de nierfunctie kan beïnvloeden. Bespreek daarom steeds een eventuele verandering van de thuismedicatie met uw arts.
- vermoeidheid
De vermoeidheid door deze behandeling is wisselend. Probeer uw activiteiten te plannen en rust voldoende wanneer u zich vermoeid voelt.

Naspoelen

Nadat de medicatie werd toegediend, hangt de verpleegkundige nog een laatste infuuszakje met fysiologisch water aan, met de bedoeling u alle medicatie uit de infuusleiding toe te dienen en om irritatie van uw bloedvaten te vermijden. Op die manier krijgt u de voorgeschreven dosis volledig.

Nabehandeling thuis en praktische info

Als uw bloedwaarden niet goed zijn of als uw nevenwerkingen te zwaar zijn kan uw arts beslissen de behandeling uit te stellen of definitief te stoppen.

Bij vragen of ongemakken kan u contact opnemen met het ziekenhuis, zie telefoonlijst in deze infogids.