Halaven

La chimiothérapie décrite ci-après est administrée en hôpital de jour. Un cycle compte 21 jours. La première dose de chimiothérapie est administrée en hôpital de jour, le jour 1. La deuxième dose est administrée une semaine plus tard (jour 8). Vient ensuite une semaine de repos sans traitement.

Ce traitement, qui consiste en une prise de sang, une consultation chez votre médecin traitant et l'administration du médicament, dure environ une demi-journée. Il est conseillé de vous faire accompagner, surtout pour la première administration.

Vous trouverez, ci-après, un aperçu chronologique des médicaments qui vous seront administrés, ainsi que leurs éventuels effets secondaires. Tous les médicaments sont préparés dans des poches à perfusion distinctes et administrés dans un de vos vaisseaux sanguins à l'aide d'une tubulure de perfusion.

Litican

Litican est un médicament destiné à limiter autant que possible les nausées et/ou les vomissements éventuels. Il est injecté directement dans la tubulure de perfusion, peu avant et peu après l'administration de la chimiothérapie.

Après l'administration de votre traitement, l'infirmier/ère vous remettra quelques comprimés de ce médicament, à emporter chez vous. Vous pouvez prendre ces comprimés lorsque vous en avez besoin (jusqu'à six par jour), avec un peu d'eau.

Pour que ce médicament vous soit remboursé, une attestation doit être transmise au conseiller médical de la mutuelle. L'hôpital s'en chargera pour vous.

Halaven

Halaven est l'agent chimiothérapeutique qui vous sera administré après Litican. Le produit est dissous dans une perfusion de 100 ml, administrée pendant 5 minutes environ.

azdelta
Uw ziekenhuis.

Cette brochure est revisée le 14/10/2021 0520 5972-FR

Halaven provoque généralement peu de nausées. Si nécessaire, vous pouvez prendre jusqu'à six comprimés de Litican par jour chez vous en cas de nausées.

Effets secondaires possibles :

- **Perte de cheveux** chez environ la moitié des patients.
- **Faible nombre de globules blancs**, entraînant un risque accru d'infection. Vous ne pouvez rien y faire vous-même. Nous vous conseillons toutefois d'être attentive à de possibles infections et/ou à la présence de fièvre. Un faible nombre de globules blancs accompagné de fièvre/d'une infection peut provoquer très rapidement des infections très graves. **En cas de fièvre et/ou d'infection, prévenez donc toujours immédiatement votre médecin et rendez-vous aux urgences !!** Une prise de sang intermédiaire sera généralement prévue chez votre médecin généraliste pendant la semaine de repos (environ une semaine après la dernière administration du traitement).
- **Des crampes abdominales et une diarrhée** peuvent également survenir. En cas de diarrhée, vous pouvez toujours prendre de l'Imodium (jusqu'à six par jour). Néanmoins, si la diarrhée persiste au-delà de 24 heures ou en cas de troubles graves, prévenez immédiatement votre médecin. Dans certains cas, une hospitalisation peut être nécessaire afin d'éviter la déshydratation due à la diarrhée.
- **Constipation** : (selles dures et difficiles à évacuer). Pour y remédier, prenez à temps un laxatif tel que du sirop Movicol ou des sachets de Forlaxing.
- **Neuropathie** : parfois, des picotements ou une sensation de brûlure peuvent apparaître au bout des doigts/sur la plante des pieds. Signalez toujours ce trouble à votre médecin traitant.
- **Douleurs musculaires et articulaires**. Faiblesse musculaire.
- **Altération du goût.**
- Anomalies du bilan hépatique sanguin.
- **Anomalies de l'électrocardiogramme cardiaque** (allongement de l'intervalle QT). De nombreux autres médicaments peuvent également avoir des répercussions sur le cœur. Ne commencez donc jamais à prendre un nouveau médicament de votre propre initiative. Parlez-en toujours à votre médecin généraliste et à votre médecin traitant.
- **Fatigue.**

Rinçage

Après l'administration de tous les médicaments, l'infirmier/ère installera une dernière poche à perfusion contenant du sérum physiologique, afin de vous administrer tous les médicaments restés dans la tubulure de perfusion. Vous aurez ainsi reçu la dose prescrite.

Vous avez d'autres questions ? N'hésitez pas à nous contacter.
Vous trouverez nos coordonnées au début de votre dossier.