

Glucagontest



azdelta

Uw ziekenhuis.

Beste patiënt

Uw kind zal in het kinderdagziekenhuis een Glucagontest ondergaan. Bij dit onderzoek zal de arts in het bloed nagaan of het lichaam genoeg groei- en stresshormoon aanmaakt. Aan de hand van een prikje in de bil zal de verpleegkundige Glucagon® inspuiten. Enerzijds stimuleert het de hypofyse -een klier die in een holte onder uw hersenen ligt- om extra groeihormoon af te geven. Anderzijds zorgt het ervoor dat het suikergehalte van het bloed eerst omhoog en daarna omlaag gaat. Wanneer het suikergehalte daalt, maakt het lichaam meer groei- en stresshormoon aan. In deze brochure geven we u meer info hierover.

De dienst kinderziekten

Nuchter zijn?

Uw kind moet nuchter zijn voor dit onderzoek. Concreet betekent dit dat uw kind vanaf middernacht voor het onderzoek niet meer mag eten of drinken. Ontbijten mag dus niet. Een slokje water kan geen kwaad.

Uw arts kan u aanraden om bepaalde medicatie al een paar dagen voor de test in te nemen.

Opname

De test vindt plaats in het kinderdagziekenhuis. De verpleegkundige zal een infuus plaatsen door een prik in de hand of arm. Een infuus is een dun plasticen buisje dat in het bloedvat blijft zitten. Op deze manier kan de verpleegkundige op verschillende tijdstippen bloed nemen zonder dat opnieuw moet worden geprikt. Desgewenst kan een verdovende pleister (Rapydan®) worden gebruikt op de plaats waar geprikt wordt. Vervolgens zal de verpleegkundige bloed afnemen en Glucagon® toedienen via een prik in de bil. Daarna mag uw kind met het infuus naar de kamer. Na de eerste bloedafname

en het toedienen van de Glucagon® mag uw kind iets eten. Om het halfuur zal de verpleegkundige opnieuw bloed afnemen. In totaal zal men dit 6 keer doen. Daar zal uw kind niets van voelen. De test duurt 3 uur. Na de test wordt het infuus verwijderd en mag u terug naar huis.

Bijwerkingen

Het medicijn Glucagon® zorgt ervoor dat het suikergehalte in het bloed in eerste instantie stijgt. Hier merkt men normaal niets van.

Na ongeveer anderhalf uur gaat het suikergehalte in het bloed naar beneden. Dit noemt men hypoglycemie. Door een hypoglycemie kan uw kind zich misselijk voelen en braken. Het is ook mogelijk dat uw kind het warm krijgt en begint te zweten. Daarnaast kan uw kind er slaperig door worden. Door de toediening van Glucagon® kan uw kind zich de hele dag minder fit voelen. Het is daarom belangrijk om het de rest van de dag rustig aan te doen.

Uitslag

3 weken na de test kunt u contact opnemen met het secretariaat van de arts om de resultaten van de test en de volgende stappen te bespreken.

Kostprijs

Alle kosten voor uw verblijf en verzorging, komen op de ziekenhuisfactuur. Hebt u vragen over de ziekenhuisfactuur, neem dan gerust contact op met de dienst facturatie op het nummer 051 23 39 89 of via factuur@azdelta.be.

Contact

DIENST KINDERZIEKTEN

Campus Rumbeke

t kinderafdeling 051 23 62 31

t kinderdagziekenhuis 051 23 63 38

Campus Menen

t 056 52 21 76

Campus Torhout

t 050 23 23 41

www.azdelta.be

www.kinderafdeling.azdelta.be

28 april 2020

Kinderartsen

Campus Rumbeke

Secretariaat

t 051 23 63 94

Campus Menen

Secretariaat

t 056 530533 (Dr. Ann Demeester , dr. Jijo John & dr. Shady Al Hanini)

t 057 333603 (Dr. Peter Boucquey)

Campus Torhout

Secretariaat

t 050 23 24 34