

# Het gebruik van OFEV® (nintedanib)



**azdelta**

Uw ziekenhuis.

## Beste patiënt

OFEV® is een medicament dat gebruikt wordt voor de behandeling van patiënten met een zogenaamde interstitiële longaandoening (ILD).

OFEV® remt de vorming van littekenvorming af en houdt de symptomen van de ziekte onder controle. In deze brochure vindt u meer uitleg over gebruik en dosering van deze medicatie.

## De dienst longziekten

# Gebruik van de medicatie

OFEV® is een medicament dat onder vorm van een capsule wordt ingenomen. Er zijn twee dosissen beschikbaar: 150 mg en 100 mg.

Deze medicatie krijgt u steeds mee uit het ziekenhuis en is niet beschikbaar in de gewone apotheek.



## Dosering

Bij opstart wordt bijna altijd gekozen om te starten met de hoogste dosis, namelijk 150 mg. Er zijn enkele zaken waar u als patiënt dient op te letten bij de inname van OFEV.

### Aandachtspunten inname

- De capsules moeten twee maal per dag ingenomen worden.
- Probeer ongeveer 12 uur tussen te laten.
- Neem de medicatie steeds in met voedsel.
- Als u een capsule vergat in te nemen, laat die dan gewoon achterwege. Compenseer nooit door twee capsules tegelijkertijd in te nemen.

# Mogelijke bijwerkingen

- **Diarree**

In geval van diarree kan het medicament Imodium® ingenomen worden tot maximaal 6 keer per dag. Houden de klachten daarna aan, neem dan contact op met een zorgverlener.

- **Misselijkheid (en braken)**

Bij misselijkheid en braken kan ondersteunende medicatie voorgeschreven worden (vb. Motilium®, Primperan®...)

- **Verminderde eetlust**

- **Verandering in leverfunctiewaarden**

Om de verandering in leverfunctiewaarden goed te kunnen opvolgen, vragen we u om bij opstart met de medicatie wekelijks een bloedafname te laten uitvoeren via de huisarts. Dit gedurende de eerste zes weken. Als deze waarden gedurende zes weken onder controle blijven, volstaat het om uw bloed maandelijks te laten controleren.

De mogelijke bijwerkingen kunnen een behoorlijke impact hebben op uw dagelijks functioneren. Indien de nevenwerkingen blijven aanhouden kan het noodzakelijk zijn om de medicatie (tijdelijk) te onderbreken en te kiezen voor een lagere dosis. Bij blijvende klachten kan u advies opnemen met de de gespecialiseerde verpleegkundige voor verder advies. U vindt de contactgegevens op de achterkant van deze brochure.

# Notities

A series of 20 horizontal dotted lines for taking notes.

Blank page with horizontal dotted lines for writing.

Handwriting practice lines consisting of 20 horizontal dotted lines.

# Contact

## **Secretariaat longziekten**

051 23 72 16

## **Gespecialiseerde verpleegkundige**

Mathijs Bonne

**t** 051 23 76 18

**e** mathijs.bonne@azdelta.be

[www.azdelta.be](http://www.azdelta.be)

*Bron: dienst longziekten*